

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДО 10:30 ПО ГРИНВИЧУ 21 НОЯБРЯ 2005 ГОДА

Карибский регион

В 2005 году в Карибском регионе эпидемия СПИДа унесла жизни 24 000 человек, в результате чего СПИД превратился в основную причину смертности среди взрослого населения в возрасте 15-44 лет. Общее число людей, живущих с ВИЧ в Карибском регионе, составляет 300 000 человек, включая 30 000 человек, которые были инфицированы в 2005 году.

- По оценкам, национальный показатель распространенности ВИЧ превышает 1% на **Барбадосе**, в **Доминиканской Республике**, **Суринаме** и на **Ямайке**, 2% на **Багамских Островах**, в **Гайане** и **Тринидаде и Тобаго** и 3% на **Гаити**. С другой стороны, на **Кубе** этот показатель еще не достиг 0,2%.
- Эпидемии в данном регионе в основном развиваются в результате гетеросексуальных контактов, в то же время заметную роль играет коммерческий секс, особенно на фоне сильной нищеты, высокого уровня безработицы и гендерного неравенства.
- Общая доля ВИЧ-инфекций, обусловленных половыми контактами между мужчинами, составляет приблизительно 12%, однако неприязнь к гомосексуалистам и жесткие социально-культурные табу, которые стигматизируют сексуальные отношения между людьми одного пола, означают, что фактическая пропорция может быть несколько выше. В настоящее время употребление инъекционных наркотиков обуславливает небольшую долю ВИЧ-инфекций; это явление вносит значительный вклад в распространение ВИЧ только на **Бермудских Островах** и в **Пуэрто-Рико**.
- Число новых ВИЧ-инфекций среди женщин превышает число таких инфекций среди мужчин. В **Тринидаде и Тобаго** уровни ВИЧ-инфекций среди девушек в возрасте 15-19 лет в шесть раз выше, чем среди юношей того же возраста. Во многих странах половую жизнь начинают сравнительно рано: обследования, проведенные среди женщин в возрасте 15-29 лет на **Барбадосе**, показали, что уже к 15 годам они начали половую жизнь.
- Эпидемия на **Гаити**, одна из самых старых в мире, возможно, достигла своего поворотного пункта. В целом процент беременных женщин, имеющих положительную реакцию на ВИЧ, с 1993 по 2003-2004 годы снизился в два раза – с 6,2% до 3,1%. Эта тенденция более всего заметна в городских районах (где показатель распространенности ВИЧ снизился с 9,4% в 1993 году до 3,7% в 2003-2004 годах) и особенно среди женщин в возрасте 15-24 лет; это указывает на значительное снижение темпов появления новых ВИЧ-инфекций в городах этой страны. Тем не менее число людей, живущих с ВИЧ на **Гаити**, по-прежнему самое высокое в Карибском регионе.
- В **Доминиканской Республике** уровни распространенности ВИЧ-инфекций среди беременных женщин снижаются с конца 1990-х годов – общий показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин устойчиво находится на уровне 1,4%. Низкие показатели распространенности ВИЧ в 3-4%, обнаруженные среди работников секс-бизнеса в Санто-Доминго, вероятно, отражают усилия, направленные на пропаганду постоянного пользования презервативами и принятие более безопасного поведения работниками секс-бизнеса.

- Показатель распространенности ВИЧ на **Багамских Островах** снизился; это свидетельствует о том, что улучшение мер профилактики могло способствовать появлению такой тенденции.
- В **Барбадосе** число новых ВИЧ-инфекций среди беременных женщин снизилось в два раза с 1999 по 2003 годы (показатель распространенности ВИЧ снизился с 0,7% до 0,3%). Расширение доступа к антиретровирусному лечению уменьшило смертность от СПИДа в два раза в 1998-2003 годах – такая же тенденция была отмечена на **Бермудских Островах** в 2000-2002 годах
- На **Ямайке** большая часть ВИЧ-инфекций регистрируется в городских районах, при этом более всего пострадали округа Кингстона, Сент-Эндрюс и Сент-Джеймс. Показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин оставался на уровне 1-2% начиная с середины 1990-х годов, хотя последние данные эпиднадзора за ВИЧ в дородовых клиниках указывают на то, что этот показатель может несколько снижаться в ряде районов страны.
- Как и на Ямайке, незащищенные гетеросексуальные контакты являются ведущим фактором развития эпидемии в **Тринидаде и Тобаго**, где, по оценкам, общенациональный показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения в 2003 году превысил 3%.
- По состоянию на конец 2003 года чуть менее 2% взрослого населения **Суринама** жило с ВИЧ. Число новых случаев ВИЧ увеличилось в 3 раза с середины 1990-х, однако эта тенденция, вероятно, в основном объясняется расширением тестирования.
- Эпидемия на **Кубе** остается самой незначительной в Карибском регионе. В то же время отмечается рост числа новых ВИЧ-инфекций, причем меры профилактики, принимаемые на **Кубе**, вероятно, не соответствуют условиям, способствующим распространению ВИЧ, включая увеличение разницы в доходах и рост секс-бизнеса. В то же время, программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку на **Кубе** остается очень эффективной. Все беременные женщины проходят тестирование на ВИЧ, причем все имеющие положительный результат теста получают антиретровирусные препараты.
- В то время как на **Кубе** обеспечен всеобщий доступ к лечению, а на **Багамских Островах** и на **Барбадосе** обеспечен относительно высокий уровень охвата, доступ к лечению остается низким в трех наиболее пострадавших странах Карибского региона. В сентябре 2005 года около одной трети всех лиц, нуждающихся в антиретровирусном лечении, получали такое лечение в **Тринидаде и Тобаго**, в то время как на **Гаити** это число составляло всего лишь 12%, а в **Доминиканской Республике** всего лишь 10%.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или к Аннмари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе, visit www.unaids.org.