

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДО 10:30 ПО ГРИНВИЧУ 21 НОЯБРЯ 2005 ГОДА

## Латинская Америка

*По оценкам, число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, возросло до 1,8 миллиона человек. В 2005 году примерно 66 000 человек умерли от СПИДа, а 200 000 были впервые инфицированы. Среди молодежи в возрасте 15 – 24 лет примерно 0,4% женщин и 0,6% мужчин жили с ВИЧ в 2005 году.*

- В таких странах Южной Америки, как **Аргентина**, **Бразилия** и **Колумбия** отмечаются самые крупные эпидемии в регионе, главным образом, из-за большого населения этих стран. Самая высокая распространенность наблюдается в странах меньшего размера - **Белизе**, **Гватемале** и **Гондурасе** – где примерно 1% и более взрослых были инфицированы ВИЧ в конце 2003 года.
- Развитию эпидемий в регионе способствует сочетание различных факторов – незащищенный секс и потребление инъекционных наркотиков, причем роль секса между мужчинами для передачи ВИЧ является довольно значимым фактором. Почти во всех странах Латинской Америки самые высокие уровни ВИЧ-инфекции были обнаружены именно среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами (от 2% до 28% в разных районах). Второй по значению уровень ВИЧ-инфекции отмечается среди женщин секс-бизнеса (от 0% до 6,3%). Секс между мужчинами стал причиной 25–35% официально зарегистрированных случаев СПИДа в **Аргентине**, **Боливии**, **Бразилии**, **Гватемале** и **Перу**.
- До настоящего времени в самой крупной и населенной стране региона, **Бразилии**, развивается разнотипная эпидемия, которая уже проникла во все из 26 штатов страны. Хотя уровень национальной распространенности среди беременных женщин до сих пор ниже 1%, все большее число новых случаев инфицирования происходит именно среди женщин, и те из них, кто живет в условиях нищеты и лишений, подвергаются непропорционально высокому риску инфекции.
- По данным исследования 2004 года, 36% людей в возрасте 15–24 лет в **Бразилии** занимались сексом до достижения 15-летнего возраста, и только 62% знали, как передается ВИЧ.
- В городах **Бразилии**, похоже, снижается уровень передачи ВИЧ при потреблении инъекционных наркотиков - этот успех можно отнести на счет программ снижения вреда. Официальные оценки показывают, что три четверти из примерно 200 000 потребителей инъекционных наркотиков Бразилии сегодня пользуются стерильными шприцами.
- В **Аргентине** большинство новых инфекций происходит при незащищенных гетеросексуальных контактах, и все больше женщин заражается ВИЧ. Соотношение официально зарегистрированных случаев СПИДа среди мужчин и женщин снизилось с 15:1 в 1988 году до 3:1 в 2004 году.
- Потребление инъекционных наркотиков и небезопасный секс между мужчинами продолжают способствовать распространению ВИЧ в **Аргентине**, особенно в городских районах Буэнос-Айреса, провинций Кордоба и Санта-Фе, где отмечается примерно 80% случаев СПИДа. При проведении тестирования в Буэнос-Айресе оказалось, что около 44% потребителей инъекционных наркотиков были ВИЧ-положительными, в то время как по данным разных исследований распространенность ВИЧ среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, составила от 7% до 15%.

- В **Парагвае** ВИЧ-инфекция ширится в сельских районах, особенно вдоль границ с **Аргентиной** и **Бразилией**.
- Эпидемия в **Боливии** остается незначительной (по большей части она сконцентрирована в городских районах), а ее основной движущей силой является секс-бизнес и половые отношения между мужчинами. Уровень инфекции в группах мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, достигал 15% в Ла-Пасе и почти 24% в Санта-Крузе. Исследование, проведенное в городе Кочабамба, показало, что 3,5% опрошенных уличных детей живут с ВИЧ; большинство было инфицировано половым путем.
- Секс между мужчинами, похоже, является серьезным фактором в растущей эпидемии в **Эквадоре**, где число новых зарегистрированных случаев ВИЧ с 2001 года почти удвоилось и достигло 573 в 2004 году.
- В **Колумбии** ВИЧ сначала поражал в основном мужчин, причем настолько сильно, что сегодня на них приходится 83% всех случаев СПИДа, официально зарегистрированных национальной системой здравоохранения. Однако значительная часть MSM также поддерживают половые отношения с женщинами. В результате этого заражается все больше женщин.
- ВИЧ в **Центральной Америке** распространяется как среди уязвимых групп, так и среди широких масс населения в некоторых странах. Вирус передается в основном при незащищенных половых контактах.
- В **Гондурасе** насчитывается примерно треть всех людей, живущих с ВИЧ в этом субрегионе. Хотя оценочная национальная распространенность ВИЧ среди взрослых здесь чуть менее 2%, СПИД является основной причиной смертности среди гондурасских женщин и, по мнению специалистов, второй по значимости причиной госпитализации и смертности в целом по стране.
- Секс между мужчинами отмечается также и в эпидемиях меньшего масштаба в **Сальвадоре**, **Никарагуа** и **Панаме**, где среди MSM была выявлена распространенность ВИЧ на уровне 18%, 9% и 11% соответственно.
- В **Коста-Рике** секс между мужчинами является определяющим фактором эпидемии в стране; здесь на MSM приходится более двух третей всех зарегистрированных случаев СПИДа.
- Национальная распространенность ВИЧ среди взрослого населения **Мексики** оставалась на уровне значительно ниже 1%, однако в разных частях этой большой страны отмечаются различные модели эпидемии. Почти 90% официально зарегистрированных случаев СПИДа связано с незащищенным сексом, и почти половина из них приходится на секс между мужчинами.
- Доступ к антиретровирусной терапии в Латинской Америке значительно расширился, хотя достижения **Бразилии** в этой сфере до сих пор остаются уникальными. В рамках бразильской политики предоставления антиретровирусных препаратов всем нуждающимся люди на продвинутой стадии ВИЧ-инфекции имеют право на получение АРВ-препаратов в учреждениях национальной системы здравоохранения. Число граждан Бразилии, получающих АРВ-терапию продолжает расти и в сентябре 2005 года составило примерно 170 000 человек.
- Также высокий уровень охвата лечением отмечается в **Аргентине**, **Венесуэле**, **Мексике**, на **Кубе**, в **Уругвае** и **Чили**, хотя условия его получения не такие благоприятные, как в Бразилии. В **Коста-Рике** и **Панаме**, где доступ к АРВ-терапии заметно улучшился, смертность от СПИДа начинает снижаться. Однако во всех других странах, особенно в беднейших странах **Центральной Америки** и **Андского региона Южной Америки**, прогресс не настолько велик.

*За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или к Аннмари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе, [www.unaids.org](http://www.unaids.org).*