



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
ЮНЭЙДС
УВКБ-ЮНИСЕФ-МПП-ПРООН-ЮНФЛА
ЮНОДК-МОТ-ЮНЕСКО-ВОЗ-ВСЕМИРНЫЙ БАНК



Всемирная
организация здравоохранения

Информационный бюллетень

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДО 10:30 ПО ГРИНВИЧУ 21 НОЯБРЯ 2005 ГОДА

Северная Америка, Западная и Центральная Европа

Число людей, живущих с ВИЧ в Северной Америке, Западной и Центральной Европе, в 2005 году выросло до 1,9 миллиона человек, из них приблизительно 65 000 человек заразилось ВИЧ в прошлом году. Широкий доступ к антиретровирусной терапии позволил удержать сравнительно низкую смертность от СПИДа на уровне около 30 000 случаев.

- В целом, профилактические усилия отстают от темпов развития изменяющихся эпидемий в ряде стран, где меняются основные модели передачи ВИЧ. Несмотря на то, что секс между мужчинами, а в меньшей части стран также и употребление инъекционных наркотиков остаются значительными путями передачи ВИЧ, растет число людей, которые заражаются в результате незащищенных гетеросексуальных контактов.
- По оценкам специалистов, на конец 2003 года число людей, живущих с ВИЧ в **Соединенных Штатах Америки (США)**, впервые превысило один миллион человек. Это свидетельствует о том, что ВИЧ-инфицированные люди живут дольше, благодаря антиретровирусному лечению, а также о том, что не удалось адаптировать и поддерживать на прежнем уровне успехи в профилактике, достигнутые в первые 10-15 лет эпидемии.
- В **США** незащищенный секс между мужчинами остается преобладающим путем передачи ВИЧ и, по последним данным, послужил причиной 63% новых диагнозов ВИЧ-инфекции в 2003 году. В том же году около 20% новых случаев инфицирования произошло вследствие употребления инъекционных наркотиков. Для женщин, живущих с ВИЧ, небезопасный гетеросексуальный половой акт является основным путем передачи – по оценкам, в 2003 году таким образом заразились 73% женщин.
- Так же, как и в **Соединенном Королевстве**, предположительно четвертая часть людей, живущих с ВИЧ в **США**, не знают о том, что они инфицированы, и это незнание, вполне вероятно, служит дополнительным фактором развития эпидемии.
- На долю афроамериканцев в 2003 году приходилось 48% новых случаев ВИЧ в **США**. Вероятность инфицирования ВИЧ для афроамериканских женщин в десятки раз выше, чем для их белых соотечественниц. Среди молодых мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, распространенность ВИЧ среди афроамериканцев (32%) более чем в четыре раза превышает распространенность среди белых мужчин (7%) и более чем в два раза распространенность среди выходцев из Латинской Америки (14%). Половина людей, умерших от СПИДа в 2003 году, были афроамериканцами.
- Хотя, по последним подсчетам, лечение от СПИДа в **США** спасло примерно два миллиона лет жизни, афроамериканцы не смогли в равной степени воспользоваться всеми преимуществами такого продлевающего жизнь лечения. По данным одного недавнего исследования, афроамериканцам предоставляется в два раза меньше антиретровирусного лечения по сравнению с другими группами населения. СПИД стал одной из трех основных причин смертности среди мужчин-афроамериканцев в возрасте 25-54 лет и женщин-афроамериканок в возрасте 25-34 лет.
- В **Канаде** на конец 2004 года было зарегистрировано почти 58 000 диагнозов ВИЧ. За последние пять лет количество ежегодно регистрируемых новых случаев ВИЧ-инфекции выросло на 20%, и на женщин сегодня приходится более четверти новых диагнозов ВИЧ. Это соответствует растущей доле (30% в 2004

году) диагнозов ВИЧ, связанных с гетеросексуальной передачей вируса.

- В **Западной Европе** насчитывается более полумиллиона людей, живущих с ВИЧ, и это число продолжает расти; в некоторых странах отмечаются признаки возобновления рискованного сексуального поведения. Самым большим изменением в характере эпидемии в **Западной Европе** стало то, что в нескольких странах гетеросексуальные контакты стали преобладающей причиной новых случаев ВИЧ-инфекции. Из более чем 20 000 новых диагнозов ВИЧ-инфекции, поставленных в 2004 году, более одной трети приходилось на женщин. Значительная часть новых диагнозов была поставлена выходцам из стран с серьезными эпидемиями, в основном из Африки к югу от Сахары.
- Существует несколько причин удвоения числа новых диагнозов ВИЧ в **Соединенном Королевстве** с 2000 года (с 3 499 до 7 258 в 2004 году). Одной из них является рост количества проведенных тестов, однако в основном рост вызван резким увеличением числа случаев инфицирования ВИЧ при гетеросексуальном половом контакте, примерно 80% которых произошли в странах с высокой распространенностью вируса.
- Небезопасный секс между мужчинами, бывший ранее основным путем передачи вируса, по-прежнему является причиной приблизительно одной четверти новых диагнозов ВИЧ в **Соединенном Королевстве** (1 900 в 2004 году); при этом отмечаются признаки того, что сексуальное поведение высокого риска не снижается.
- Секс между мужчинами остается серьезным фактором в эпидемиях во **Франции** и **Нидерландах**, а в **Бельгии, Дании, Португалии** и **Швейцарии** наметился небольшой, а в **Германии** – значительный рост ежегодного числа новых случаев ВИЧ-инфекции, обусловленных сексом между мужчинами. В **Германии** в период с 2001 по 2004 г. число новых диагнозов ВИЧ среди МСМ почти удвоилось (с 530 до 982), и незащищенный секс между мужчинами стал основной причиной устойчивого общего роста новых диагнозов ВИЧ, число которых составило 2 058 в 2004 году (на 44% больше, чем в 2001 году, когда было зарегистрировано 1425 случаев).
- Число диагнозов ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков резко снизилось в 1990-х годах в **Испании** после введения в действие проектов по лечению метадонотерапией и по обмену игл и шприцев. Число новых случаев ВИЧ среди ПИН также резко сократилось в **Португалии** (1 000 в 2004 году по сравнению с 2 400 в 2000 году), а в 2004 году они составили немногим более трети всех новых диагнозов ВИЧ, поставленных в 2004 году (для сравнения: еще в 2002 году их доля составляла почти половину).
- Среди диагнозов ВИЧ, обусловленных гетеросексуальными контактами во **Франции** в течение 2003 года, 69% приходилось на мигрантов, почти две трети (65%) из которых были женщины. В целом, в 18 странах Западной Европы, где имеются данные о ВИЧ-инфекции за 2004 год, на женщин приходится 35% всех новых диагнозов, по сравнению с 29% в 2000 году.
- В целом в **Центральной Европе** эпидемии остаются ограниченными и небольшими по масштабам. В 2004 году почти половина случаев с установленным путем передачи была обусловлена незащищенными гетеросексуальными отношениями. Лишь в нескольких странах, включая **Чешскую Республику, Венгрию, Словению** и **Словацкую Республику**, секс между мужчинами является основным путем передачи ВИЧ-инфекции.
- **Западная Европа** и **Северная Америка** остаются единственными регионами мира, где большинство нуждающихся в антиретровирусной терапии в состоянии ее получить. Благодаря этому число смертей от СПИДа в конце 1990-х годов резко снизилось. В Западной Европе эта тенденция сохранилась, и число смертей среди больных СПИДом значительно снизилось с 3 905 в 2000 году до 2 252 в 2004 году— то есть, на 42%.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или к Аннамари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе, www.unaids.org.