


BURUNDI

RAPPORT D'AVANCEMENT SUR LE PLAN MONDIAL 2014


visant à éliminer les nouvelles infections à VIH chez
les enfants à l'horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie

BURUNDI


Le Burundi comptait 1300 nouvelles infections à VIH chez les enfants en 2013, une baisse de 49 % depuis 2009, et le nombre de cas de nouvelles infections chez les femmes était moins de 450. Ces chiffres reflètent un pays qui, avec un effort concerté, pourrait mettre un terme à de nouvelles infections à VIH chez les enfants et les femmes en âge de procréer dans un temps réduit. En 2013, 58 % des femmes enceintes vivant avec le VIH bénéficiaient de traitement antirétroviral pendant la grossesse et l'accouchement, mais cette proportion a chuté à 22 % pendant la période d'allaitement maternel. Le diagnostic et le traitement pédiatriques restent des domaines à améliorer et à renforcer ; en 2013, seulement 17 % des nourrissons exposés au VIH ont bénéficié d'un diagnostic précoce en temps opportun, et 12 % des enfants âgés de 0 à 14 ans ont reçu des médicaments antirétroviraux.




Le nombre de nouvelles infections à VIH chez les enfants (0–14 ans)



Pourcentage d'enfants vivant avec le VIH (0–14 ans) bénéficiant d'un traitement antirétroviral




L'augmentation de la couverture par les antirétroviraux a entraîné une baisse du taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant



Le nombre de femmes (15–49 ans) nouvellement infectées à VIH a diminué de 3 % depuis 2009




Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH qui reçoivent des médicaments antirétroviraux, et la proportion de celles qui reçoivent un traitement antirétroviral à vie



■ Tout régime antirétroviral
■ Traitement antirétroviral à vie

Le pourcentage de besoins non satisfaits en planification familiale



Source: enquête démographique et de santé auprès de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 2010.

Source: Estimations d'ONUSIDA 2013, sauf indication contraire. Chaque année, tous les pays mettent à jour leurs estimations sur le VIH, y compris les tendances historiques de ces estimations. Les résultats de 2013 reflètent la mise à jour de la surveillance des données de programme et de modèles améliorés. Les estimations de 2013 sont susceptibles d'être différentes des estimations produites au cours des années précédentes et sont soupçonnées d'être plus précises que les estimations précédentes. La couverture du traitement antirétroviral pédiatrique est basée sur tous les enfants vivant avec le VIH, tandis que dans les années précédentes, il a été limité aux enfants admissibles pour le traitement antirétroviral.



ONUSIDA
Programme conjoint des
Nations Unies sur le VIH/SIDA

20 Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse

+41 22 791 3666
distribution@unaids.org

unaids.org