


# Maintenir l'élan vers la fin du sida dans les pays de la Francophonie



**Copyright: © 2018**

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)

Tous droits de reproduction réservés.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'ONUSIDA aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. L'ONUSIDA ne garantit pas que l'information contenue dans la présente publication est complète et correcte et ne pourra être tenu pour responsable des dommages éventuels résultant de son utilisation.

ONUSIDA

Maintenir l'élan vers  
la fin du sida dans les pays  
de la Francophonie

## LA FIN DU SIDA RESTE EN VUE

Les 54 États membres de l'Organisation internationale de la Francophonie abritent environ 10% des 36,7 millions [30,8 millions–42,9 millions] de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Les efforts des pays de la Francophonie au cours des années à venir sont essentiels à la réalisation de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en juin 2016. La déclaration engageait les États Membres des Nations unies à augmenter et à accélérer les investissements dans les ripostes nationales au sida et à élargir massivement la couverture des services de lutte contre le VIH.


Les données les plus récentes communiquées à l'ONUSIDA font état de progrès. Mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030 reste à la portée des pays de la Francophonie et du monde entier. Toutefois, des obstacles majeurs se dressent sur le chemin. Les plus vulnérables de la société sont laissés de côté lorsque la prestation des services de lutte contre le VIH se limite à des contextes de soins traditionnels. Pour que le sida appartienne désormais à l'histoire, une approche

globale est requise, qui mobilise les familles et les communautés, fait appel aux personnes qui en ont le plus besoin et leur donne les moyens d'utiliser les services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH. Des approches inclusives et innovantes bâtiront des sociétés plus saines, et permettront d'atteindre les objectifs de développement durable et de santé globale.

## S'APPROCHER DES CIBLES 90-90-90

L'expansion continue de la couverture de la thérapie antirétrovirale dans les pays de la Francophonie a principalement contribué à une baisse de près d'un tiers (30%) des décès associés au sida depuis 2000, de 210 000 [170 000–250 000] en 2000 à 150 000 [120 000–180 000] en 2016. Ces acquis s'appuient sur les cibles 90-90-90 qui préconisent que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, que 90% de celles qui connaissent leur statut soient sous traitement et que 90% de celles qui sont sous traitement aient une charge virale supprimée. Ensemble, ces cibles se traduisent par le fait que 73% de toutes les personnes vivant avec le VIH ont une charge virale supprimée.

FIGURE 1. PROGRÈS RÉALISÉS VER LES 90-90-90, 54 PAYS DE LA FRANCOPHONIE, 2016



Source : Analyse spéciale ONUSIDA, 2017.

À la fin de l'année 2016, 59% [49–69%] des personnes vivant avec le VIH dans les pays de la Francophonie étaient au courant de leur statut VIH. Parmi celles qui connaissaient leur statut VIH, 81% [68– >89%] avaient accès à la thérapie antirétrovirale, et 72% [61–84%] des personnes ayant accès au traitement avaient une charge virale supprimée. Six pays de la Francophonie—Belgique, Cambodge, Canada, France, Luxembourg et Suisse—avaient atteint ou étaient près d'atteindre la cible de 73% de toutes les personnes vivant avec le VIH avec une charge virale supprimée. Des progrès notables ont été réalisés dans de nombreux autres pays : le Burundi, le Gabon et le Rwanda sont parmi les pays où l'on estime que les trois quarts au moins des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut VIH en 2016 ; et au moins 85% des personnes vivant avec le VIH qui connaissaient leur statut avaient accès au traitement aux Comores, au Niger, en République démocratique du Congo et au Rwanda.


Le succès d'une plus grande couverture de la thérapie antirétrovirale a apporté son lot de défis. De nombreuses personnes qui ont contracté le VIH dans leur trentaine ou quarantaine sont maintenant dans la soixantaine et au-delà. Les complications à long terme des médicaments antirétroviraux, les maladies liées au mode de vie et à l'âge créent des enjeux de santé importants pour les personnes plus âgées vivant avec le VIH. Des maladies non transmissibles associées à l'âge peuvent aggraver la progression du VIH. En outre, les recherches indiquent que les personnes vivant avec le

VIH pourraient courir un risque jusqu'à cinq fois plus élevé d'être affectées par une maladie chronique, en particulier une maladie cardiovasculaire, des syndromes gériatriques et une comorbidité – même parmi les personnes chez lesquelles la charge virale a été durablement supprimée.

## LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT EST SUR LE DÉCLIN, MAIS TROP D'ENFANTS VIVANT AVEC LE VIH SONT PRIVÉS DU TRAITEMENT

En 2016, l'Assemblée générale des Nations unies s'est engagée en faveur de la double élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis congénitale. Le pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH dans les pays de la Francophonie bénéficiant de médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant ou en tant que traitement à vie a grimpé de 31% [24–36%] en 2010 à 70% [55–81%] en 2016. Au cours de cette même période, les nouvelles infections à VIH parmi les enfants de 0 à 14 ans ont baissé de moitié, de 44 000 [34 000–54 000] en 2010 à 22 000 [15 000–31 000] en 2016. Malgré ces avancées, la couverture du traitement pédiatrique contre le VIH est anormalement faible dans les pays de la Francophonie. En 2016, seuls 28% [20–35%] des enfants (de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH avaient accès à la thérapie antirétrovirale.

FIGURE 2. NOUVELLES INFECTIONS À VIH PARMIS LES ENFANTS (DE 0 À 14 ANS) ET COUVERTURE DES TRAITEMENTS ANTIRÉTROVIRAUX POUR PRÉVENIR LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT, 54 PAYS DE LA FRANCOPHONIE, 2000-2016



Source : Estimations ONUSIDA pour 2017.

## LENT DÉCLIN DES NOUVELLES INFECTIONS À VIH PARMIS LES ADULTES


Une gamme toujours plus large d'outils ayant fait leurs preuves sont disponibles pour la prévention du VIH, notamment les préservatifs masculins et féminins, la prophylaxie préexposition (PrEP) orale, la circoncision masculine médicale volontaire et la réduction des risques pour les personnes qui s'injectent des drogues. Il existe un ensemble de données probantes démontrant que la fourniture d'une combinaison d'options de prévention du VIH, notamment la thérapie antirétrovirale, réussit à réduire l'incidence de l'infection à VIH. Toutefois, peu de pays ont établi de solides stratégies de prévention combinées et réalisé des investissements suffisants pour faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre, et les lois et politiques nationales ne parviennent souvent pas à protéger les personnes les plus exposées au risque d'infection. Il en résulte que les nouvelles infections à VIH parmi les adultes (de 15 ans et plus) dans les pays de la Francophonie n'ont baissé que de 12% depuis 2010, de 170 000 [150 000–190 000] en 2010 à 150 000

[130 000–170 000] en 2016. Treize pays représentaient 80% de ces nouvelles infections à VIH en 2016 : Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, France, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Tchad et Viet Nam.

### Adolescentes et jeunes femmes

Dans les contextes où la prévalence du VIH est plus élevée, les jeunes femmes et les adolescentes sont particulièrement exposées au risque d'infection. En Haïti, par exemple, où la prévalence du VIH a atteint un pic d'environ 4% parmi les adultes (de 15 à 49 ans) au début des années 1990 et a baissé à 2,1% [1,9–2,3%] en 2016, les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) représentaient 18% des 7900 [6000–11 000] nouvelles infections à VIH en 2016. Des schémas épidémiques similaires peuvent s'observer dans les pays de la Francophonie en Afrique subsaharienne, avec une prévalence du VIH chez les adultes supérieure à 2%. Dans ces pays, les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) représentaient 22% des nouvelles infections à VIH en 2016, et les femmes de tous âges représentaient 60% des personnes vivant avec le VIH.

FIGURE 3. NOUVELLES INFECTIONS PARMIS LES ADULTES, PAR ÂGE ET SEXE, PAYS SÉLECTIONNÉS DE LA FRANCOPHONIE, 2016



Source : Estimations ONUSIDA pour 2017.

Les inégalités entre les sexes, les normes sexistes néfastes et l'accès insuffisant à l'éducation accroissent le risque de contracter le VIH pour les femmes. La violence ou la peur de la violence limitent la capacité des femmes à insister pour avoir des rapports sexuels à moindre risque et à accéder aux services de santé sexuelle et reproductive. L'insécurité alimentaire est associée à un risque sexuel accru par le biais de rapports sexuels de nature transactionnelle et d'une incapacité à négocier des rapports sexuels moins risqués. Une attention croissante a été accordée au rôle que peuvent jouer les relations entre partenaires présentant une grande différence d'âge. Les


différences d'âge plus marquées parmi les partenaires sont associées à un usage plus faible du préservatif et à des taux d'infections sexuellement transmissibles plus élevés parmi les adolescentes et les jeunes femmes.

### Populations clés


Dans tous les contextes épidémiques, les populations clés – personnes qui s'injectent des drogues, professionnel(le)s du sexe, personnes transgenres, détenus, et hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – et leurs partenaires sexuels sont exposés à un risque élevé d'infection à VIH.

**FIGURE 4. PRÉVALENCE DU VIH PARMIS LES POPULATIONS CLÉS, PAYS SÉLECTIONNÉS DE LA FRANCOPHONIE, 2015-2016**


#### Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes



#### Personnes qui s'injectent des drogues



#### Professionnel(le)s du sexe



Source : ONUSIDA, Rapport mondial sur le suivi de la lutte contre le sida.

Dans les pays de la Francophonie, les données disponibles les plus récentes indiquent que parmi les hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, un sur 10 vivait avec le VIH en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Liban, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, à Maurice, au Niger, en République centrafricaine, en Roumanie, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo ; plus d'un(e) professionnel(le) du sexe sur 10 vivait avec le VIH au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en Guinée, à Maurice, au Niger, au Rwanda et au Togo; et plus d'une personne sur 10 qui s'injectent des drogues vivait avec le VIH au Cambodge, à Maurice, en Roumanie, au Sénégal et au Viet Nam.

## METTRE FIN LA STIGMATISATION ET LA DISCRIMINATION

La stigmatisation persistante à l'encontre des personnes vivant avec le VIH, ou exposées au risque d'infection, mène à des actes de discrimination dans tous les secteurs de la société – allant des fonctionnaires, des officiers de police et des agents de santé sur le lieu de travail, aux écoles et aux communautés. Dans de nombreux pays, des lois et politiques discriminatoires renforcent un environnement de violence et de marginalisation, et découragent les gens d'accéder aux services de soins de santé. La stigmatisation à l'égard des populations clés exposées à un risque élevé d'infection par le VIH est souvent renforcée par des lois pénales et autres obstacles structurels, qui à leur tour alimentent la violence, l'exploitation et un climat de crainte qui entravent les efforts destinés à fournir des préservatifs, des services de réduction des risques et d'autres méthodes de prévention primaire à des niveaux de couverture suffisants.

## SORTIR LE SIDA DE SON ISOLEMENT

Les ripostes aux épidémies de VIH, de tuberculose, d'hépatite virale et de papillomavirus humain (PVH) qui s'entrecourent sont confrontées à des défis et des caractéristiques similaires, notamment les modes de transmission, les difficultés de diagnostic et des populations affectées qui sont difficiles à atteindre. Une meilleure collaboration entre les programmes de santé peut renforcer les systèmes de santé et en améliorer l'efficacité.

De grands progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie dans la riposte mondiale à la tuberculose. Les décès liés à la tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH ont diminué de plus d'un tiers, passant d'un pic d'environ 593 000 en 2007 à 374 000 en 2016. Malgré ces avancées impressionnantes, la tuberculose reste la principale cause d'hospitalisation et de mortalité parmi les personnes vivant avec le VIH – et représente plus d'un tiers (37%) de tous les décès liés au sida en 2016 – et la neuvième cause principale de décès à travers le monde.

Parmi les 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH en 2015, l'on estime que 2,7 millions avaient une infection chronique par l'hépatite B et que 2,3 millions avaient été infectées par l'hépatite C (VHC). La fourniture de services efficaces de réduction des risques – notamment les programmes d'échange d'aiguilles et de seringues qui préviennent la transmission du VHC et du VIH parmi les personnes qui s'injectent des drogues – a été insuffisante. Fait inquiétant, les décès causés par l'hépatite virale sont en augmentation, passant de 1,10 million en 2000 à 1,34 million en 2015.

Les femmes vivant avec le VIH sont de quatre à cinq fois plus exposées au risque de développer un cancer du col de l'utérus. Ce risque est lié au papillomavirus humain (VPH), une infection courante qui est difficile à éliminer chez les femmes dont le système immunitaire est défaillant. Une stratégie clé pour minimiser les décès dus au cancer du col de l'utérus consiste en une vaccination précoce des adolescentes, avant le début de la vie sexuelle. Toutefois, à ce jour les programmes de vaccination contre le VPH ont concerné avant tout les pays à revenu élevé.

## MAINTENIR L'ÉLAN

### Comblent l'écart de la prévention

Mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030 reste un objectif réalisable. Toutefois, les progrès lents quant à la réduction des nouvelles infections parmi les adultes font état de lacunes et défis qui doivent être abordés. Tous les pays de la Francophonie sont invités à utiliser la Feuille de route de la prévention du VIH pour prendre des mesures concrètes immédiates afin d'accélérer les progrès vers la réalisation de



leurs engagements de 2020 sur la prévention du VIH à l'aide d'approches éclairées par des données probantes, centrées sur les individus et fondées sur les droits. Les actions programmatiques recommandées comprennent notamment le passage à l'échelle urgent des programmes de distribution de préservatifs, de la réduction des risques et de la PrEP orale. Les changements juridiques et politiques doivent se concentrer sur l'élimination des obstacles structurels et politiques aux services auxquels sont confrontées les adolescentes, les jeunes femmes et les populations clés et sur la réalisation progressive de leurs droits humains.

### **Se joindre à une révolution sur le dépistage du VIH**

Les pays de la Francophonie sont priés appelés à se joindre à une révolution sur le test VIH qui assurera la réalisation des cibles 90–90–90 d'ici à 2020. Les pays devraient rendre largement disponibles les dernières innovations en matière de test VIH pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ces innovations comprennent notamment le test à l'échelle communautaire, l'autotest et l'aide à la notification du partenaire. L'élargissement du diagnostic précoce chez le nourrisson et l'enfant et l'accélération du développement et de l'introduction de formules antirétrovirales pédiatriques sont essentiels à l'augmentation de la couverture du traitement salvateur pour les enfants vivant avec le VIH. Des mécanismes au point d'intervention pour le diagnostic précoce chez le nourrisson sont particulièrement prometteurs, de même que les efforts visant à offrir le test aux enfants de tous les adultes traités pour le VIH, et à offrir le test VIH aux jeunes enfants se présentant pour une vaccination, des services de lutte contre la malnutrition et un traitement antituberculeux. Le dépistage volontaire de routine et répété pour le VIH initié par le fournisseur de soins devrait faire partie de l'ensemble des services de base pour les soins avant la grossesse, et pour les soins prénataux et postpartum dans tous les pays confrontés à des épidémies de VIH généralisées, et sur le plan mondial pour les femmes appartenant aux populations clés.

### **Approches inclusives, communautaires et centrées sur la famille**

L'engagement des communautés dans la prestation de services de santé et de lutte contre le VIH accroît la couverture dans divers contextes, allant de villages en Afrique de l'Ouest à des mégapoles d'Asie. Les agents de santé communautaires peuvent offrir des soins centrés sur la famille à des familles entières au cours de la même visite, facilitant le test des couples, le diagnostic précoce chez le nourrisson et l'observance du traitement. Les organisations à base communautaire ont la capacité unique d'engager les populations clés et autres personnes qui sont difficiles à atteindre. Des soins continus plus rentables, plus efficaces et plus complets peuvent être dispensés par le biais d'une meilleure intégration des services de lutte contre le VIH à des services pour les maladies non transmissibles, les infections sexuellement transmissibles, la santé sexuelle et reproductive au sens large, les troubles liés à la consommation de substances, la santé mentale, l'hépatite, la tuberculose, la sécurité transfusionnelle, les soins gériatriques et la violence sexiste. La réforme ou la suppression des lois discriminatoires et punitives et la mise en œuvre de normes juridiques protectrices responsabilisent les individus et les communautés, et fournissent un environnement où les gens ont le sentiment de pouvoir accéder librement aux services de santé, dans la dignité et sur un pied d'égalité avec les autres. Pour atténuer la stigmatisation et la discrimination sociétales, il est essentiel de protéger activement les droits des populations marginalisées.

Le sida n'est pas terminé, mais son élimination reste possible. Tous les outils nécessaires sont disponibles. La réalisation des cibles de l'accélération d'ici à 2020 exige que tous les pays adoptent des approches innovantes et inclusives : exploiter pleinement les données issues de la surveillance et des programmes et utiliser une approche centrée sur les lieux et les populations pour garantir efficacement que chaque personne qui en a besoin—quels que soient son sexe, son âge et son niveau de revenu—ait accès aux options multiples de prévention efficace, au test VIH et au traitement, et ait les connaissances et les protections juridiques nécessaires pour utiliser ces services.

# ALBANIE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<100 [<100–<100]	<200 [<200–<200]	<500 [<200–<500]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,02 [0,02–0,03]	0,05 [0,04–0,05]	0,08 [0,07–0,09]
Décès liés au sida	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Personnes vivant avec le VIH	<500 [<500–<500]	<1000 [<1000–<1000]	1700 [1500–2000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	<1000	47% [41%–53%]
Sont sous traitement	<1000	30% [26%–34%]
Adultes sous traitement antirétroviral	480	29% [24%–32%]
Ont une charge virale indétectable	<500	24% [21%–27%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	4,7%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	31,7%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	51,4%
Femmes	24,9%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	47,7%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤350 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	6 300
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	7
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	9,8%
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# ARMÉNIE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<500 [<500–<500]	<500 [<200–<500]	<500 [<200–<500]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,10 [0,07–0,16]	0,07 [0,06–0,09]	0,09 [0,06–0,12]
Décès liés au sida	<200 [<100–<200]	<200 [<200–<500]	<200 [<100–<200]
Personnes vivant avec le VIH	3000 [2000–3800]	3200 [2500–4000]	3300 [2700–4100]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	2000	60% [48%–73%]
Sont sous traitement	1.200	36% [29%–44%]
Adultes sous traitement antirétroviral	1200	35% [29%–43%]
Ont une charge virale indétectable	<1000	25% [20%–31%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<200 [<100–<200]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	17%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	39,4%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	76,4%
Femmes	18,3%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <18 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Oui
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	US\$ 4 222 796
Dépenses intérieures publiques	US\$ 1 945 687
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 2 277 109

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	5 600
Prévalence du VIH	0,1%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	99%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	259
Couverture des programmes de prévention du VIH	71,3%
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	9 400
Prévalence du VIH	0,5%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	54,9%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	96,9%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	72
Couverture des programmes de prévention du VIH	51,8%
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	5,3%
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	12 500
Prévalence du VIH	0,8%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	80,4%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	77
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	1,2%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	162

# BELGIQUE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	...	...	...
Incidence du VIH pour 1000 habitants	...	...	...
Décès liés au sida	...	...	...
Personnes vivant avec le VIH	...	...	...

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	...	...
Adultes sous traitement antirétroviral	...	...
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100
	[<100—<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgence du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	0,7%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	22%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	12,3%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	60,7%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# BÉNIN

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	4600 [3300–6300]	4100 [2700–6100]	3600 [2200–5800]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,61 [0,43–0,82]	0,46 [0,3–0,68]	0,34 [0,21–0,56]
Décès liés au sida	4100 [2600–6300]	2400 [1400–3900]	2400 [1400–3900]
Personnes vivant avec le VIH	58 000 [40 000–86 000]	60 000 [42 000–85 000]	67 000 [47 000–94 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	38 000	57% [40%–80%]
Adultes sous traitement antirétroviral	36 100	60% [43%–83%]
Ont une charge virale indétectable	16 000	23% [16%–32%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1100 [<1000–1700]	<500 [<200–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	18% [11%–29%]	32% [19%–52%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	19% [12%–27%]	>95% [65%–>95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1000 [<1000–1400]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	25,9%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	46%
Femmes	34,9%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	22,4%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	93,3%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	55,4%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <16 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	US\$ 16 793 567
Dépenses intérieures publiques	US\$ 3 028 371
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 13 765 196

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	14 926
Prévalence du VIH	15,7%
Connaissent leur statut VIH	83,3%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	92,3%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	4,7%
Connaissent leur statut VIH	52,1%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	30,8%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	90,9%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	5 845
Prévalence du VIH	7,1%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	91,5%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	6 847
Prévalence du VIH	1,4%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# BULGARIE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	...	...	...
Incidence du VIH pour 1000 habitants	...	...	...
Décès liés au sida	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<200]	<200 [<200–<200]
Personnes vivant avec le VIH	1500 [1300–1700]	3100 [2900–3400]	3500 [3100–3800]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	<1000	26% [23%–28%]
Adultes sous traitement antirétroviral	890	26% [24%–29%]
Ont une charge virale indétectable	<1000	18% [16%–19%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	18,8%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	US\$ 12 925 532
Dépenses intérieures publiques	US\$ 9 865 382
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 3 060 150

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	92%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	34,3%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	72,9%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	13
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	18,5%
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	80,5%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	10 158
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	14

# BURKINA FASO

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	4400 [3200–5900]	3900 [2700–5300]	3400 [2200–5000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,34 [0,25–0,46]	0,26 [0,18–0,35]	0,19 [0,12–0,28]
Décès liés au sida	11 000 [9100–13 000]	5700 [3600–7500]	3100 [2000–4500]
Personnes vivant avec le VIH	120 000 [95 000–150 000]	100 000 [80 000–120 000]	95 000 [77 000–120 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	57 000	60% [49%–74%]
Adultes sous traitement antirétroviral	54 700	65% [52%–79%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1400 [<1000–2000]	<1000 [<500–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	8% [6%–10%]	24% [17%–32%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	48% [36%–61%]	83% [65%–95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<1000 [<1000–1300]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	0,7%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	32,4%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	74,2%
Femmes	59%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	88,7%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2014
Dépenses totales	US\$ 44 802 991
Dépenses intérieures publiques	US\$ 12 552 143
Dépenses intérieures privées	US\$ 2 403 081
Dépenses internationales	US\$ 29 847 767

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	30 945
Prévalence du VIH	16,2%
Connaissent leur statut VIH	82,4%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	88,5%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	26 821
Prévalence du VIH	3,6%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	76,3%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	6 827
Prévalence du VIH	3%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# BURUNDI

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	3900 [2600–5400]	4400 [2500–6400]	2200 [<1000–6000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,51 [0,33–0,69]	0,47 [0,27–0,69]	0,20 [0,07–0,53]
Décès liés au sida	8700 [7400–10 000]	6400 [5000–7500]	2900 [1800–4200]
Personnes vivant avec le VIH	110 000 [93 000–130 000]	93 000 [75 000–110 000]	84 000 [65 000–110 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	63 000	75% [58%→95%]
Sont sous traitement	51 000	61% [47%–82%]
Adultes sous traitement antirétroviral	48 200	67% [52%–91%]
Ont une charge virale indétectable	44 000	53% [41%–71%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1800 [1000–2500]	<500 [<200–1300]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	12% [10%–14%]	25% [18%–33%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	37% [27%–48%]	84% [59%→95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1900 [1200–2700]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	45,1%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	45,4%
Femmes	21,6%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	33,2%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Oui
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Non
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	US\$ 18 171 157
Dépenses intérieures publiques	US\$ 1 325 852
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 16 845 305

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	21,3%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	52,5%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	290
Prévalence du VIH	4,8%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	44,9%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...



# CAMBODGE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	3900 [3500–4300]	1600 [1500–1800]	<1000 [<1000–<1000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,29 [0,26–0,32]	0,11 [0,1–0,13]	0,04 [0,04–0,05]
Décès liés au sida	7600 [6700–8500]	2600 [1600–3800]	1800 [1300–2900]
Personnes vivant avec le VIH	90 000 [74 000–110 000]	81 000 [69 000–96 000]	71 000 [62 000–82 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	57 000	80% [70%–92%]
Adultes sous traitement antirétroviral	53 100	79% [69%–92%]
Ont une charge virale indétectable	53 000	75% [66%–86%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<500 [<500–<500]	<100 [<100–<500]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	77% [65%–91%]	87% [69%–95%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	34% [28%–40%]	75% [57%–95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1400 [<1000–2100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	39,6%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	72,8%
Femmes	41,5%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	56,5%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	2,1%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	19,4%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <18 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2012
Dépenses totales	US\$ 50 883 718
Dépenses intérieures publiques	US\$ 5 212 931
Dépenses intérieures privées	US\$ 956 837
Dépenses internationales	US\$ 44 713 950

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	34 000
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	88,8%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	8
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	1 300
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	72,6%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	29,4%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	382
Couverture des programmes de prévention du VIH	78%
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	22,1%
Naloxone disponible (2016)	Oui
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	30 891
Prévalence du VIH	2,3%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	69,4%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	16
Couverture des programmes de prévention du VIH	69,4%
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	3 080
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	76,5%
Utilisation du préservatif	62,6%
Couverture des programmes de prévention du VIH	72,8%
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# CAMEROUN

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	50 000 [45 000–55 000]	36 000 [31 000–42 000]	32 000 [22 000–41 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	2,90 [2,64–3,19]	1,86 [1,56–2,17]	1,39 [0,95–1,8]
Décès liés au sida	28 000 [23 000–33 000]	27 000 [24 000–31 000]	29 000 [25 000–33 000]
Personnes vivant avec le VIH	520 000 [480 000–560 000]	560 000 [500 000–620 000]	560 000 [470 000–650 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	330 000	58% [49%–67%]
Sont sous traitement	210 000	37% [31%–43%]
Adultes sous traitement antirétroviral	197 000	38% [32%–45%]
Ont une charge virale indétectable	110 000	19% [16%–22%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	7100 [4600–9200]	4000 [1600–6500]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	8% [6%–9%]	18% [14%–23%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	40% [31%–49%]	74% [56%–90%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	18 000 [11 000–26 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	63,2%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	73,6%
Femmes	54,5%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	93,9%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	40,5%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Oui
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2013
Dépenses totales	US\$ 63 385 444
Dépenses intérieures publiques	US\$ 14 805 716
Dépenses intérieures privées	US\$ 4 581 930
Dépenses internationales	US\$ 43 997 798

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	112 580
Prévalence du VIH	24,3%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	96%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	28 598
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	67,3%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	77,9%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	3,96%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# CANADA

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	...	...	...
Incidence du VIH pour 1000 habitants	...	...	...
Décès liés au sida	...	...	...
Personnes vivant avec le VIH	...	...	...

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	...	...
Adultes sous traitement antirétroviral	...	...
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<200
	[<200—<200]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	89 856
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	349 837
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# CAP VERT

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	...	...	...
Incidence du VIH pour 1000 habitants	...	...	...
Décès liés au sida	<200 [<200–<500]	<200 [<100–<200]	<100 [<100–<200]
Personnes vivant avec le VIH	2500 [1900–3200]	2500 [2000–3200]	2800 [2300–3600]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	1.600	57% [47%–75%]
Adultes sous traitement antirétroviral	1500	57% [47%–74%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	28% [19%–38%]	65% [47%–91%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	50% [36%–72%]	0% [0%–0%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<200]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2014
Dépenses totales	US\$ 3 749 653
Dépenses intérieures publiques	US\$ 2 343 480
Dépenses intérieures privées	US\$ 31 000
Dépenses internationales	US\$ 1 375 173

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# CENTRAFRIQUE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	8100 [6900–9700]	9000 [7400–11 000]	8700 [6600–12 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	2,12 [1,79–2,53]	2,12 [1,73–2,57]	1,80 [1,37–2,39]
Décès liés au sida	14 000 [12 000–17 000]	9500 [7900–11 000]	7300 [6000–8800]
Personnes vivant avec le VIH	160 000 [130 000–180 000]	130 000 [110 000–160 000]	130 000 [110 000–160 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	32 000	24% [20%–29%]
Adultes sous traitement antirétroviral	30 000	25% [20%–30%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1400 [<1000–1800]	<1000 [<500–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	6% [5%–7%]	18% [13%–22%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	39% [30%–49%]	81% [61%–95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	8600 [5300–13 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	9,2%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	25,4%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# COMORES

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,02 [<0.01–0.05]	0,01 [<0.01–0.04]	<0.01 [<0.01–0.03]
Décès liés au sida	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Personnes vivant avec le VIH	<100 [<100–<500]	<200 [<100–<500]	<200 [<100–<500]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	<100	38% [16%→95%]
Sont sous traitement	<100	35% [15%→95%]
Adultes sous traitement antirétroviral	40	38% [15%→95%]
Ont une charge virale indétectable	<100	32% [14%→95%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	4,2%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	20,5%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	59,7%
Femmes	28,4%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	99,3%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	55,8%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Non
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Non
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	US\$ 836 125
Dépenses intérieures publiques	US\$ 39 512
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 796 613

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	53,8%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# CONGO

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	5200 [4600–5900]	6500 [5700–7600]	7600 [5400–10 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	1,53 [1,37–1,75]	1,65 [1,44–1,92]	1,65 [1,17–2,18]
Décès liés au sida	6000 [5300–6900]	3700 [3100–4300]	3800 [3200–4600]
Personnes vivant avec le VIH	69 000 [58 000–78 000]	75 000 [65 000–85 000]	91 000 [78 000–110 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	26 000	29% [25%–34%]
Sont sous traitement	21 000	23% [20%–27%]
Adultes sous traitement antirétroviral	19 300	23% [20%–26%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<1000 [<1000–1100]	1100 [<1000–1300]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	17% [13%–20%]	25% [18%–30%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	18% [13%–22%]	16% [12%–20%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	6400 [3900–9500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	18,2%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	58%
Femmes	38,3%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	99,1%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	35,4%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# CÔTE D'IVOIRE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	33 000 [29 000–37 000]	25 000 [20 000–29 000]	20 000 [14 000–26 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	1,87 [1.63–2.11]	1,27 [1.01–1.49]	0,86 [0.59–1.13]
Décès liés au sida	43 000 [34 000–51 000]	29 000 [24 000–33 000]	25 000 [21 000–29 000]
Personnes vivant avec le VIH	590 000 [520 000–660 000]	520 000 [460 000–570 000]	460 000 [390 000–520 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	230 000	>95% [50%–66%]
Sont sous traitement	190 000	41% [35%–47%]
Adultes sous traitement antirétroviral	181 000	43% [36%–48%]
Ont une charge virale indétectable	150 000	32% [27%–37%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	5500 [4000–6700]	3300 [2200–4600]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	11% [9%–13%]	25% [20%–30%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	26% [21%–31%]	73% [55%–87%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	8500 [5500–12 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	4,9%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	10%

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	18,4%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	62,6%
Femmes	38,2%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	32,2%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	97%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	44,5%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <14 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2013
Dépenses totales	US\$ 103 855 516
Dépenses intérieures publiques	US\$ 13 736 337
Dépenses intérieures privées	US\$ 807 455
Dépenses internationales	US\$ 89 311 724

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	9 211
Prévalence du VIH	11%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	81%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	23,3%

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	120
Prévalence du VIH	5,3%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	50,4%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	59 040
Prévalence du VIH	11,2%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	84%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	22%

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	12 369
Prévalence du VIH	2,1%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...



# DJIBOUTI

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<1000 [<500–1000]	<1000 [<500–<1000]	<500 [<500–<1000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,79 [0,36–1,34]	0,63 [0,37–0,99]	0,58 [0,28–1,04]
Décès liés au sida	<1000 [<1000–1100]	<1000 [<500–1100]	<1000 [<500–<1000]
Personnes vivant avec le VIH	12 000 [8500–17 000]	10 000 [6400–14 000]	8600 [5700–13 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	2 200	26% [17%–39%]
Adultes sous traitement antirétroviral	2200	28% [18%–42%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<200 [<100–<200]	<100 [<100–<200]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	4% [3%–5%]	9% [6%–13%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	11% [7%–17%]	35% [23%–52%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<200 [<200–<500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	18,6%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	11,3%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2014
Dépenses totales	US\$ 4 037 950
Dépenses intérieures publiques	US\$ 790 008
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 3 247 942

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	12,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	66,4%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# EGYPTE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<1000 [<500–<1000]	<1000 [<1000–<1000]	1600 [1400–1700]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	<0.01 [<0.01–<0.01]	0,01 [<0.01–0.01]	0,02 [0.02–0.02]
Décès liés au sida	<200 [<200–<200]	<500 [<200–<500]	<500 [<500–<500]
Personnes vivant avec le VIH	3500 [3100–3800]	6000 [5500–6600]	11 000 [10 000–12 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	6500	57% [53%–63%]
Sont sous traitement	3.100	27% [25%–30%]
Adultes sous traitement antirétroviral	3000	27% [24%–29%]
Ont une charge virale indétectable	1.400	12% [11%–13%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	25% [23%–27%]	38% [35%–41%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	9% [8%–11%]	18% [16%–20%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	80%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Oui
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	No*
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	US\$ 4 062 230
Dépenses intérieures publiques	US\$ 1 253 800
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 2 808 430

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	22 986
Prévalence du VIH	2,8%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	93 314
Prévalence du VIH	2,4%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	2,3%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	31,5%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	64 318
Prévalence du VIH	6,2%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	38,8%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# ERY MACÉDOINE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	<0,01 [<0,01–<0,01]	0,01 [0,01–0,01]	0,02 [0,01–0,02]
Décès liés au sida	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Personnes vivant avec le VIH	<200 [<200–<200]	<500 [<200–<500]	<500 [<500–<500]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	<200	48% [42%–55%]
Adultes sous traitement antirétroviral	170	48% [42%–55%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤350 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	93,3%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	46,5%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	96,4%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	1,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	51,8%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# FRANCE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	6200 [5600–7000]	6200 [5600–6800]	6000 [5600–6600]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,10 [0,1–0,11]	0,10 [0,1–0,11]	0,09 [0,09–0,1]
Décès liés au sida	<1000 [<1000–1100]	<1000 [<1000–1000]	<1000 [<1000–1000]
Personnes vivant avec le VIH	130 000 [110 000–140 000]	150 000 [140 000–170 000]	180 000 [170 000–200 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	140 000	78% [71%–85%]
Adultes sous traitement antirétroviral	140 000	78% [71%–85%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	78% [69%–88%]	>95% [90%–>95%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	>95% [95%–>95%]	>95% [95%–>95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<500 [<500–<1000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# GABON

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	3600 [2800–4300]	2500 [1400–3300]	1700 [<1000–2900]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	2,51 [2–3,02]	1,57 [0,9–2,04]	0,92 [0,4–1,58]
Décès liés au sida	3200 [2400–4100]	2900 [2300–3700]	1500 [1000–2000]
Personnes vivant avec le VIH	53 000 [43 000–65 000]	50 000 [42 000–59 000]	48 000 [38 000–59 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	38 000	79% [61%–>95%]
Sont sous traitement	30 000	63% [49%–77%]
Adultes sous traitement antirétroviral	28 900	65% [50%–80%]
Ont une charge virale indétectable	3.400	7% [5%–9%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<1000 [<500–<1000]	<500 [<100–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	8% [6%–11%]	39% [28%–48%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	20% [15%–26%]	76% [54%–>95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<500 [<200–<500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	5,6%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	32%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	74,8%
Femmes	54,5%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	99,1%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	25,3%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Non
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	No*
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2014
Dépenses totales	US\$ 5 659 276
Dépenses intérieures publiques	US\$ 4 808 085
Dépenses intérieures privées	US\$ 396 750
Dépenses internationales	US\$ 454 441

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# GRÈCE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	...	...	...
Incidence du VIH pour 1000 habitants	...	...	...
Décès liés au sida	...	...	...
Personnes vivant avec le VIH	...	...	...

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	...	...
Adultes sous traitement antirétroviral	...	...
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100
	[<100—<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	8,5%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	47,7%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	86%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	1,3%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# GUINÉE ÉQUATORIALE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	2500 [2000–3100]	2600 [2000–3400]	2300 [1200–4200]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	4,11 [3,33–4,99]	3,73 [2,77–4,82]	2,71 [1,45–4,95]
Décès liés au sida	<1000 [<1000–1300]	1100 [<1000–1400]	<1000 [<1000–1400]
Personnes vivant avec le VIH	18 000 [14 000–22 000]	26 000 [23 000–30 000]	35 000 [28 000–45 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	15 000	43% [34%–55%]
Adultes sous traitement antirétroviral	14 500	45% [36%–58%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<500 [<500–<1000]	<200 [<100–<500]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	2% [1%–2%]	16% [12%–20%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	20% [16%–26%]	90% [65%–>95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<1000 [<1000–<1000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Oui
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <16 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	US\$ 9 136 171
Dépenses intérieures publiques	US\$ 5 636 171
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 3 500 000

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# GUINÉE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	9900 [8500–12 000]	8900 [7200–11 000]	8300 [6200–11 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	1,06 [0,91–1,24]	0,84 [0,67–1,01]	0,67 [0,5–0,89]
Décès liés au sida	7000 [5600–8500]	5200 [4300–6300]	5800 [4600–7100]
Personnes vivant avec le VIH	99 000 [84 000–110 000]	110 000 [94 000–130 000]	120 000 [100 000–150 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	44 000	35% [25%–43%]
Adultes sous traitement antirétroviral	41 900	37% [26%–45%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1700 [1300–2200]	1300 [<1000–1800]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	8% [5%–10%]	18% [12%–23%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	18% [14%–23%]	43% [32%–53%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	5400 [3500–7900]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	25,5%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	52,9%
Femmes	34,3%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	24,6%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	99,1%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	80,1%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <16 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Oui
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	14,2%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	95,9%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	8,5%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...



# GUINÉE-BISSAU

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	5100 [3600–4900]	2600 [2700–3800]	1300 [1800–3200]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	3,70 [2,63–3,53]	1,68 [1,79–2,5]	0,72 [1,02–1,83]
Décès liés au sida	1700 [1100–1900]	2300 [1400–2100]	2000 [1400–1800]
Personnes vivant avec le VIH	37 000 [27 000–34 000]	42 000 [34 000–41 000]	36 000 [34 000–47 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	12 000	33% [30%–41%]
Adultes sous traitement antirétroviral	11 300	35% [33%–46%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<1000 [<1000–<1000]	<500 [<500–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	4% [3%–4%]	15% [12%–15%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	15% [13%–17%]	85% [89%–>95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1800 [1100–2600]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	22,3%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# HAÏTI

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	11 000 [9400–13 000]	11 000 [8900–13 000]	7900 [6000–11 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	1,23 [1,07–1,45]	1,11 [0,93–1,36]	0,77 [0,58–1,05]
Décès liés au sida	11 000 [9300–12 000]	6100 [4900–7600]	4600 [3500–6100]
Personnes vivant avec le VIH	130 000 [120 000–150 000]	140 000 [130 000–150 000]	150 000 [140 000–170 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	90 000	61% [55%–68%]
Sont sous traitement	85 000	55% [50%–61%]
Adultes sous traitement antirétroviral	81 000	56% [51%–62%]
Ont une charge virale indétectable	59 000	38% [35%–42%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1500 [1200–1800]	<1000 [<500–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	16% [14%–18%]	49% [42%–57%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	38% [33%–43%]	71% [62%–81%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	3400 [2200–4900]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	8,4%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	31,9%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	63,9%
Femmes	51%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	45,6%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	5,8%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	57,7%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Oui
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <18 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Oui
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Non
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	69,5%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	71,8%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	622
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	4,3%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# LAOS

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	1100 [<1000–1200]	<1000 [<1000–1100]	<1000 [<1000–<1000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,20 [0,18–0,22]	0,17 [0,16–0,19]	0,10 [0,09–0,11]
Décès liés au sida	<200 [<200–<500]	<500 [<500–<500]	<500 [<500–<500]
Personnes vivant avec le VIH	5900 [5300–6600]	9500 [8300–11 000]	11 000 [10 000–13 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	4.600	41% [36%–47%]
Adultes sous traitement antirétroviral	4400	41% [36%–47%]
Ont une charge virale indétectable	3.600	32% [28%–37%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<200]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	27% [23%–30%]	34% [30%–40%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	9% [8%–11%]	50% [43%–58%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<1000 [<500–<1000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	13%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	53,5%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <14 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Non
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	13 400
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	92,7%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	187
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	1 600
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	50 000
Prévalence du VIH	1,6%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	44,4%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	58
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# LIBAN

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<200 [<100–<200]	<200 [<100–<200]	<200 [<200–<200]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,03 [0,02–0,03]	0,03 [0,02–0,03]	0,02 [0,02–0,03]
Décès liés au sida	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Personnes vivant avec le VIH	1200 [1100–1400]	1600 [1400–1800]	2200 [2000–2500]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	1.100	51% [45%–59%]
Adultes sous traitement antirétroviral	1100	52% [46%–61%]
Ont une charge virale indétectable	<1000	42% [37%–49%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2013
Dépenses totales	US\$ 5 191 497
Dépenses intérieures publiques	US\$ 3 154 875
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 2 036 622

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	96,3%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	3 114
Prévalence du VIH	0,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	73,9%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	4 220
Prévalence du VIH	27,5%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	75%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# LUXEMBOURG

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<200]	<200 [<100–<200]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,18 [0,17–0,19]	0,19 [0,18–0,2]	0,18 [0,17–0,2]
Décès liés au sida	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Personnes vivant avec le VIH	...	...	...

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	<1000	85% [<1%–<1%]
Sont sous traitement	<1000	75%
Adultes sous traitement antirétroviral	770	...
Ont une charge virale indétectable	<1000	68% [<1%–<1%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	0% [0%–0%]	56% [53%–59%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Non
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	No*
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

Dépenses totales	...
Dépenses intérieures publiques	...
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	78,6%
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	79,8%
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Oui
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	90,8%
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	82,6%
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# MADAGASCAR

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	1400 [<1000–1800]	2300 [1800–2800]	4300 [3000–6200]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,08 [0,05–0,1]	0,11 [0,09–0,14]	0,18 [0,12–0,26]
Décès liés au sida	1100 [<1000–1700]	1400 [1100–1700]	1600 [1300–2000]
Personnes vivant avec le VIH	19 000 [15 000–23 000]	21 000 [18 000–24 000]	31 000 [25 000–39 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	2200	7% [6%–10%]
Sont sous traitement	1.700	5% [4%–7%]
Adultes sous traitement antirétroviral	1700	6% [4%–7%]
Ont une charge virale indétectable	<1000	3% [2%–4%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<500 [<500–<500]	<500 [<500–<500]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	1% [1%–1%]	2% [2%–3%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	2% [2%–3%]	3% [2%–4%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	3600 [2200–5400]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	20,6%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	24,1%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	13,1%
Femmes	5%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	94,6%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Non
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	US\$ 3 563 919
Dépenses intérieures publiques	US\$ 356 146
Dépenses intérieures privées	US\$ 5 484
Dépenses internationales	US\$ 3 202 289

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	167 443
Prévalence du VIH	5,5%
Connaissent leur statut VIH	40,6%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	2 033
Prévalence du VIH	8,5%
Connaissent leur statut VIH	20,6%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	41,8%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	68,4%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	14 914
Prévalence du VIH	14,9%
Connaissent leur statut VIH	19,3%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	57,2%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	7 169
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# MALI

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	9500 [7500–12 000]	6600 [5000–8600]	5900 [3800–8600]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,76 [0,59–0,93]	0,44 [0,33–0,58]	0,33 [0,21–0,49]
Décès liés au sida	6900 [5900–7800]	5500 [4300–6500]	6100 [4800–7500]
Personnes vivant avec le VIH	110 000 [93 000–130 000]	110 000 [94 000–130 000]	110 000 [89 000–130 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	38 000	35% [25%–44%]
Adultes sous traitement antirétroviral	35 100	37% [26%–47%]
Ont une charge virale indétectable	10 000	9% [6%–11%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1900 [1500–2500]	1600 [1100–2300]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	10% [8%–12%]	21% [15%–26%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	32% [27%–38%]	35% [28%–42%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1400 [<1000–2000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	6,3%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	26,1%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	38,6%
Femmes	20,6%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	97,8%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	45,8%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Oui
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2013
Dépenses totales	US\$ 14 296 870
Dépenses intérieures publiques	US\$ 4 709 121
Dépenses intérieures privées	US\$ 110 446
Dépenses internationales	US\$ 9 477 303

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	35 903
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	98,1%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	749
Prévalence du VIH	5,1%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	3 671
Prévalence du VIH	13,7%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	76,9%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	5 354
Prévalence du VIH	1,4%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# MAROC

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	1700 [1200–2200]	1600 [1100–2200]	<1000 [<1000–1500]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,06 [0,04–0,08]	0,05 [0,03–0,07]	0,03 [0,02–0,04]
Décès liés au sida	<500 [<500–<1000]	<1000 [<500–<1000]	<1000 [<500–1000]
Personnes vivant avec le VIH	14 000 [10 000–17 000]	19 000 [14 000–23 000]	22 000 [16 000–28 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	14 000	63% [39%–84%]
Sont sous traitement	11 000	48% [30%–64%]
Adultes sous traitement antirétroviral	10 100	47% [29%–62%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	56% [38%–71%]	>95% [76%–>95%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	46% [36%–57%]	62% [48%–76%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<1000 [<1000–<1000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	13,8%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	22,2%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <18 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Oui
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Non
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	75 000
Prévalence du VIH	1,3%
Connaissent leur statut VIH	40,1%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	52,3%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	1 500
Prévalence du VIH	7,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	28,2%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	80%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	54
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	28,8%
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	45 000
Prévalence du VIH	5,7%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	50%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	78 000
Prévalence du VIH	0,5%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	7



# MAURITANIE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	...	...	...
Incidence du VIH pour 1000 habitants	...	...	...
Décès liés au sida	<1000 [<1000–1000]	<1000 [<1000–1100]	<1000 [<1000–1200]
Personnes vivant avec le VIH	14 000 [12 000–17 000]	14 000 [10 000–18 000]	11 000 [7100–18 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	2.600	23% [13%–38%]
Adultes sous traitement antirétroviral	2500	23% [12%–38%]
Ont une charge virale indétectable	2.100	18% [10%–30%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<200 [<100–<200]	<100 [<100–<200]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	3% [3%–4%]	23% [15%–31%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	8% [6%–10%]	34% [23%–51%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<500 [<500–<1000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	3,7%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	57,8%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	Données non soumises

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	US\$ 10 599 920
Dépenses intérieures publiques	US\$ 861 273
Dépenses intérieures privées	US\$ 182 175
Dépenses internationales	US\$ 9 556 472

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	315
Prévalence du VIH	4%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	44,4%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	488
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# MOLDAVIE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	1200 [<1000–1700]	1300 [<1000–1900]	1600 [<1000–2400]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,25 [0,18–0,36]	0,31 [0,21–0,44]	0,38 [0,23–0,56]
Décès liés au sida	<500 [<500–<500]	<500 [<500–<1000]	<500 [<500–<1000]
Personnes vivant avec le VIH	6700 [4800–9500]	11 000 [7700–15 000]	15 000 [11 000–21 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	4.500	29% [20%–40%]
Adultes sous traitement antirétroviral	4400	28% [20%–39%]
Ont une charge virale indétectable	3.300	21% [14%–29%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	38% [26%–63%]	83% [60%–95%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	75% [52%–95%]	>95% [69%–95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<1000 [<500–<1000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	13,5%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	53,7%
Femmes	33,8%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	1%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	70,8%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <18 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Oui
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	88
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	3,3%
Naloxone disponible (2016)	Oui
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	49 669
Aiguilles propres distribuées	186 207
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	78

# NIGER

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	4200 [3400–5200]	2000 [1700–2500]	1800 [1300–2300]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,33 [0,26–0,4]	0,13 [0,11–0,16]	0,09 [0,07–0,11]
Décès liés au sida	4900 [4000–6000]	4000 [3300–4700]	3400 [2900–4000]
Personnes vivant avec le VIH	68 000 [59 000–78 000]	58 000 [50 000–66 000]	48 000 [41 000–55 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	17 000	35% [27%–43%]
Sont sous traitement	15 000	32% [25%–39%]
Adultes sous traitement antirétroviral	14 300	34% [26%–41%]
Ont une charge virale indétectable	8.800	18% [14%–22%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<1000 [<1000–<1000]	<1000 [<500–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	5% [4%–6%]	17% [13%–21%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	61% [51%–72%]	52% [45%–61%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1000 [<1000–1500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	8%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	21,5%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	64,3%
Femmes	35,1%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	40,9%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	99,4%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	71,5%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <16 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	46 630
Prévalence du VIH	17%
Connaissent leur statut VIH	97,5%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	88%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	11
Couverture des programmes de prévention du VIH	71,3%
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	11 928
Prévalence du VIH	17,6%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	78,9%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	8
Couverture des programmes de prévention du VIH	34,3%
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	16 669
Prévalence du VIH	1,9%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	35 000 [29 000–42 000]	21 000 [16 000–26 000]	13 000 [7200–19 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,65 [0,52–0,77]	0,33 [0,25–0,41]	0,17 [0,09–0,24]
Décès liés au sida	40 000 [33 000–48 000]	35 000 [29 000–40 000]	19 000 [13 000–24 000]
Personnes vivant avec le VIH	520 000 [430 000–610 000]	450 000 [360 000–530 000]	370 000 [290 000–450 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	170 000	...
Sont sous traitement	160 000	42% [33%–52%]
Adultes sous traitement antirétroviral	143 000	44% [35%–54%]
Ont une charge virale indétectable	120 000	31% [24%–38%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	8200 [5800–10 000]	2900 [<1000–4800]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	4% [3%–5%]	30% [21%–37%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	8% [6%–10%]	70% [50%–89%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	39 000 [23 000–57 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	20,4%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	30,7%
Femmes	22,6%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	97,4%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	49,2%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2014
Dépenses totales	US\$ 233 893 300
Dépenses intérieures publiques	US\$ 31 498 942
Dépenses intérieures privées	US\$ 97 139 495
Dépenses internationales	US\$ 105 254 863

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	5,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	60%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	22%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	3,3%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	77,4%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	7,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# ROUMANIE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<1000 [<1000–<1000]	<1000 [<1000–<1000]	<1000 [<1000–<1000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,04 [0,03–0,04]	0,04 [0,03–0,04]	0,04 [0,03–0,04]
Décès liés au sida	<200 [<200–<200]	<200 [<100–<200]	<200 [<200–<500]
Personnes vivant avec le VIH	11 000 [10 000–13 000]	14 000 [12 000–15 000]	16 000 [14 000–18 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	14 000	89% [80%–>95%]
Sont sous traitement	11 000	68% [61%–76%]
Adultes sous traitement antirétroviral	10 900	68% [61%–75%]
Ont une charge virale indétectable	10 000	64% [57%–72%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	>95% [>95%–>95%]	>95% [>95%–>95%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	>95% [88%–>95%]	>95% [85%–>95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<500 [<500–<500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	US\$ 82 864 018
Dépenses intérieures publiques	US\$ 81 869 538
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 994 480

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	9 019
Prévalence du VIH	21,4%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	166
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	18,2%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	56,9%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	27 455
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# RWANDA

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	13 000 [11 000–15 000]	9800 [8200–11 000]	7500 [5800–9500]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	1,65 [1,38–1,96]	1,07 [0,91–1,25]	0,70 [0,56–0,88]
Décès liés au sida	15 000 [13 000–17 000]	5600 [4100–7400]	3300 [2500–4200]
Personnes vivant avec le VIH	210 000 [180 000–240 000]	210 000 [180 000–240 000]	220 000 [200 000–250 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	200 000	87% [75%→95%]
Sont sous traitement	180 000	80% [69%–89%]
Adultes sous traitement antirétroviral	170 000	81% [72%–91%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	2100 [1200–2900]	<1000 [<500–1300]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	32% [25%–39%]	55% [38%–75%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	62% [47%–74%]	82% [63%→95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1800 [1100–2500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	51%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	65,9%
Femmes	47,5%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	29,6%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	137 218
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	9,9%
---	------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Oui
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	No*
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2012
Dépenses totales	US\$ 243 667 683
Dépenses intérieures publiques	US\$ 19 946 470
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 223 721 213

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	12 278
Prévalence du VIH	45,8%
Connaissent leur statut VIH	95,1%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	84,3%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	83%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	71,4%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# SÉNÉGAL

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	3900 [3200–4800]	1800 [1300–2300]	1100 [<1000–1700]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,37 [0,3–0,45]	0,14 [0,11–0,19]	0,08 [0,05–0,11]
Décès liés au sida	2500 [2000–3200]	1500 [1100–2000]	1900 [1500–2400]
Personnes vivant avec le VIH	45 000 [38 000–53 000]	45 000 [39 000–52 000]	41 000 [34 000–48 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	21 000	52% [38%–64%]
Adultes sous traitement antirétroviral	19 900	56% [40%–69%]
Ont une charge virale indétectable	16 000	40% [29%–49%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<1000 [<1000–<1000]	<500 [<500–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	17% [12%–20%]	26% [19%–31%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	22% [19%–26%]	55% [46%–65%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	1400 [<1000–2100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	3,4%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	28,4%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	68,9%
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	43,9%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	98,2%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	273

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	51,7%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	20 763
Prévalence du VIH	6,6%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	94,1%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	2 991
Prévalence du VIH	10,2%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	54
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	11,7%
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	9 265
Prévalence du VIH	41,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	72,6%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	8 630
Prévalence du VIH	2%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	2

# SUISSE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	...	...	...
Incidence du VIH pour 1000 habitants	...	...	...
Décès liés au sida	...	...	...
Personnes vivant avec le VIH	...	...	...

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	...	...
Adultes sous traitement antirétroviral	...	...
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	[<100—<100]
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	TRAITER TOUS

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	US\$ 7 179 990
Dépenses intérieures publiques	US\$ 7 179 990
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	...

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	20 000
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	57,14%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	42 000
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	80 000
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	76,6%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	6 884
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...



# TCHAD

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	9100 [7400–11 000]	6200 [4900–7600]	4800 [3400–6400]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,94 [0,76–1,14]	0,54 [0,43–0,66]	0,34 [0,24–0,46]
Décès liés au sida	6900 [5400–8500]	3600 [2500–4700]	2800 [1900–4000]
Personnes vivant avec le VIH	100 000 [84 000–120 000]	110 000 [89 000–130 000]	110 000 [94 000–130 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	...	...
Sont sous traitement	44 000	39% [33%–46%]
Adultes sous traitement antirétroviral	42 700	42% [36%–49%]
Ont une charge virale indétectable	36 000	32% [27%–38%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	1900 [1300–2500]	<1000 [<500–1500]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	8% [6%–11%]	14% [9%–18%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	21% [16%–27%]	63% [44%–79%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	6400 [3900–9500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	13%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	39,7%
Femmes	31,6%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	96,5%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgence du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2013
Dépenses totales	US\$ 17 632 654
Dépenses intérieures publiques	US\$ 4 622 591
Dépenses intérieures privées	US\$ 123 770
Dépenses internationales	US\$ 12 886 293

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# TOGO

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	8500 [6200–12 000]	5500 [3700–7500]	4100 [2400–6100]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	1,67 [1,22–2,27]	0,95 [0,63–1,28]	0,59 [0,34–0,88]
Décès liés au sida	8500 [5500–13 000]	7600 [5000–11 000]	5100 [3100–7700]
Personnes vivant avec le VIH	130 000 [89 000–180 000]	110 000 [82 000–160 000]	100 000 [73 000–130 000]

## 90-90-90

Personnes vivant avec le VIH qui :	2016	
Connaissent leur statut VIH	64 000	63% [46%–83%]
Sont sous traitement	51 000	51% [37%–67%]
Adultes sous traitement antirétroviral	48 100	55% [40%–71%]
Ont une charge virale indétectable	42 000	42% [30%–55%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	2200 [1400–3300]	<1000 [<500–1400]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	7% [5%–10%]	26% [16%–38%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	14% [10%–20%]	86% [59%–95%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<1000 [<1000–1200]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	62%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	26,1%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	60,7%
Femmes	42,9%
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	37,4%
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	97,7%
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	45,8%
---	-------

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Oui, <14 ans
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Pas de données disponibles
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Oui
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2015
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	10 284
Prévalence du VIH	11,7%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	95,7%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	11
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	2 289
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	...
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	7 649
Prévalence du VIH	13%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	12
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	4 122
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# TUNISIE

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	<200 [<100–<500]	<500 [<200–<500]	<500 [<200–<1000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,01 [<0.01–0.02]	0,02 [0.01–0.03]	0,03 [0.02–0.05]
Décès liés au sida	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<100]	<100 [<100–<200]
Personnes vivant avec le VIH	<1000 [<1000–1300]	1600 [1100–2300]	2900 [2000–4000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	1700	58% [40%–80%]
Sont sous traitement	<1000	29% [20%–40%]
Adultes sous traitement antirétroviral	850	29% [20%–40%]
Ont une charge virale indétectable	...	...

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTEES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	...	...
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	...	...
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	...	...

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	<100 [<100–<100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	9,9%
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	...
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	Non
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	Non
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	Oui
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	Non
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤500 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2016
Dépenses totales	Data under validation
Dépenses intérieures publiques	Data under validation
Dépenses intérieures privées	Data under validation
Dépenses internationales	Data under validation

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	25 000
Prévalence du VIH	0,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	57,5%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	38
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	9 000
Prévalence du VIH	3,9%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	29,3%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	88,6%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	17
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	28 000
Prévalence du VIH	9,1%
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	50%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	0,1%
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	...
Préservatifs distribués	148 772
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...

# VIET NAM

## L'ÉPIDÉMIE DE VIH

	2005	2010	2016
Nouvelles infections à VIH	24 000 [22 000–26 000]	17 000 [16 000–19 000]	11 000 [10 000–12 000]
Incidence du VIH pour 1000 habitants	0,28 [0,26–0,31]	0,19 [0,17–0,21]	0,12 [0,11–0,13]
Décès liés au sida	10 000 [8200–12 000]	8600 [7100–10 000]	8000 [6100–10 000]
Personnes vivant avec le VIH	190 000 [170 000–220 000]	230 000 [200 000–270 000]	250 000 [220 000–290 000]

## 90-90-90

	2016	
Personnes vivant avec le VIH qui :		
Connaissent leur statut VIH	170 000	70% [61%–79%]
Sont sous traitement	120 000	47% [41%–53%]
Adultes sous traitement antirétroviral	111 000	46% [40%–52%]
Ont une charge virale indétectable	84 000	34% [30%–38%]

## ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES

	2010	2016
Nouvelles infections à VIH—enfants	<1000 [<500–<1000]	<500 [<200–<1000]
Couverture du traitement antirétroviral—enfants	59% [50%–67%]	84% [69%–95%]
Couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont accès aux médicaments antirétroviraux	44% [36%–53%]	66% [55%–77%]

## COMORBIDITÉS VIH

Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2015)	5500 [3500–7900]
Proportion des personnes vivant avec le VIH avec une tuberculose évolutive prises en charge pour le VIH (2016)	...
Dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH	...

## PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes (15–24 ans)	46,2%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire non marié, vivant en cohabitation)	
Hommes	...
Femmes	...
Femmes de 15 à 49 ans dont la demande en matière de planification familiale est satisfaite à l'aide de méthodes modernes	...
Hommes de 15 à 49 ans qui sont circoncis	Non applicable
Circoncisions masculines pratiquées conformément aux normes nationales (2016)	Non applicable
Personnes sous PrEP (2016)	...

## STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Personnes qui signalent des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH	...
---	-----

## POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

	2016
Prestation communautaire du traitement	...
Lois exigeant le consentement parental pour l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive	...
Flexibilités prévues par les accords ADPIC incorporées dans la législation nationale	...
Lois ou politiques limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Pénalisation de la transmission, de la non-divulgaration du VIH, ou de l'exposition au VIH	...
Niveau CD4 recommandé pour le début du traitement	≤350 cells/mm3

Sauf indication contraire, les données sont tirées de la dernière enquête disponible entre 2011 et 2015. Les données financières sont en cours de validation et pourront être révisées. Pour les mises à jour, veuillez consulter <http://aidsinfo.unaids.org>

## DÉPENSES POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH

	2012
Dépenses totales	US\$ 95 446 487
Dépenses intérieures publiques	US\$ 30 327 094
Dépenses intérieures privées	...
Dépenses internationales	US\$ 65 119 393

## POPULATIONS CLÉS

### PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	2,7%
Connaissent leur statut VIH	43,3%
Couverture du traitement antirétroviral	1,9%
Utilisation du préservatif	84,15%
Préservatifs distribués aux professionnel(le)s du sexe inscrit(e)s dans les programmes de prévention (2016)	462
Couverture des programmes de prévention du VIH	32,06%
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	11%
Connaissent leur statut VIH	52,62%
Couverture du traitement antirétroviral	4,99%
Utilisation du préservatif	36,5%
Utilisation d'une aiguille propre lors de la dernière injection	95,6%
Aiguilles et seringues distribuées par personne qui s'injecte (2016)	148
Couverture des programmes de prévention du VIH	28,2%
Couverture du traitement de substitution aux opiacés (2016)	22,19%
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### HOMMES GAYS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	8,2%
Connaissent leur statut VIH	63,9%
Couverture du traitement antirétroviral	8,99%
Utilisation du préservatif	57,25%
Préservatifs distribués aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre de programmes de prévention (2016)	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	13,82%
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### PERSONNES TRANSGENRES

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Connaissent leur statut VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Utilisation du préservatif	...
Couverture des programmes de prévention du VIH	...
Évitement des services dû à la stigmatisation et la discrimination	...

### DÉTENUS

Taille estimée de la population	...
Prévalence du VIH	...
Couverture du traitement antirétroviral	...
Programmes de prévention du VIH dans les prisons (2016)	
Préservatifs distribués	...
Aiguilles propres distribuées	...
Détenus sous traitement de substitution aux opiacés	...





**ONUSIDA**  
**Programme commun des**  
**Nations Unies sur le VIH/sida**

20 Avenue Appia  
1211 Genève 27  
Suisse

+41 22 791 3666

[unaids.org](http://unaids.org)