

HOJA DE DATOS REGIONAL

Informe de ONUSIDA para el Día Mundial del Sida 2011

África subsahariana

- En 2010, cerca del 68% de todas las personas que vivían con el VIH residían en África subsahariana, una región que solo supone el 12% de la población mundial.
- Sudáfrica es el país del mundo con mayor número de habitantes que viven con el VIH (alrededor de 5,6 millones).
- Desde que la epidemia alcanzara su punto máximo en 1997, el número total de nuevas infecciones por el VIH en la región ha disminuido más de un 26%, desde **2,6 millones** [2,4 millones–2,8 millones] hasta **1,9 millones** [1,7 millones–2,1 millones].
 - En 22 países de África subsahariana, la tasa de nuevas infecciones por el VIH se redujo más de un 25% entre 2001 y 2009.
 - Sin embargo, en 2010, la región seguía representando el 70% de todas las nuevas infecciones por el VIH en el mundo.
- El sida se ha cobrado al menos un millón de vidas al año en África subsahariana desde 1998. Casi la mitad de todas las muertes relacionadas con el sida que se produjeron en 2010 tuvieron lugar en África meridional.
- En todo el mundo, la expansión más drástica de la cobertura de la terapia antirretrovírica se ha producido en África subsahariana: solo entre 2009 y 2010 aumentó un 20%.
 - Las muertes relacionadas con el sida han disminuido a un ritmo constante, a medida que aumentaba el acceso al tratamiento antirretrovírico gratuito en la región,

Asia

- La prevalencia del VIH sigue siendo considerablemente inferior en Asia que en otras regiones.
 - En 2010, cerca del 0,1% de la población de Asia oriental vivía con el VIH, y un 0,3% de los habitantes de Asia meridional y sudoriental.
 - Sin embargo, a causa de su tamaño absoluto, la población asiática representa el segundo grupo más grande de personas que viven con el VIH en el mundo.
- En Asia meridional y sudoriental, el número estimado de nuevas infecciones por el VIH en adultos y niños descendió de cerca de **380.000** [340.000–420.000] en 2001 a **270.000** [230.000–340.000] en 2010.
 - Desde 1996, cuando la epidemia registró su nivel máximo en la región, el número de nuevas infecciones por el VIH en Asia meridional y sudoriental ha descendido un 40%.

- En Asia oriental, el número de adultos y niños que ha contraído el VIH ha aumentado ligeramente, de **74.000** [54.000–100.000] en 2001 a **88.000** [48.000–160.000] en 2010.
- La prevalencia del VIH en los grupos de población clave (los profesionales del sexo, los usuarios de drogas inyectables y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) sigue siendo alta en varios países asiáticos y, con el tiempo, el virus se ha propagado a otras poblaciones.

Oceanía

- A finales de 2010, el número estimado de personas que vivían con el VIH en Oceanía llegó a **54.000** [48.000–62.000], aproximadamente un 34% más que las estimadas en 2001.
- Desde 2001, el número de nuevas infecciones por el VIH y de muertes relacionadas con el sida en la región ha descendido.
 - Entre 2001 y 2010, el número de adultos y niños que contrajeron el VIH cada año descendió de **4.000** [3.300–4.600] a **3.300** [2.400–4.200].
 - Durante este mismo periodo, las muertes relacionadas con el sida descendieron de **1.800** [1.300–2.900] a **1.600** [1.200–2.000].

Europa oriental y Asia central

- Desde 2001, el número de personas que viven con el VIH en Europa oriental y Asia central ha aumentado un 250%.
 - El número estimado de adultos y niños que viven con el VIH en la región ascendió de **410.000** [340.000–490.000] en 2001 a **1,5 millones** [1,3–1,7 millones] en 2010.
- La Federación de Rusia y Ucrania representan casi el 90% de la epidemia de la región, aunque también se presenta una transmisión considerable en las parejas sexuales de las personas que se inyectan drogas.
- Durante los últimos diez años, se ha producido un aumento significativo en el número de muertes relacionadas con el sida en la región:
 - En 2010, cerca de **90.000** [74.000–110.000] adultos y niños murieron a causa del sida, en comparación con los **7.800** [6.000–11.000] de 2001.
- El uso de drogas inyectables sigue siendo la causa principal de infección por el VIH en esta región.

América del Norte y Europa occidental y central

- En estas dos regiones, las epidemias de VIH permanecen relativamente estables.
 - En Europa occidental y central, el número de adultos y niños que contrajeron el VIH cada año entre 2001 y 2010 permaneció sin cambios en **30.000** [22.000–39.000].

- América del Norte experimentó un ligero aumento en el número de nuevas infecciones anuales por el VIH en adultos y niños, de **49.000** [34.000–70.000] en 2001 a **58.000** [24.000–130.000] en 2010.
- En ambas regiones, el número total de personas que viven con el VIH alcanzó una cifra estimada de 2,2 millones en 2010, cerca de un tercio (34%) más que en 2001.
 - Este aumento refleja la disponibilidad a gran escala del tratamiento antirretrovírico, lo que ha reducido de forma significativa la mortalidad relacionada con el sida.
- Las tendencias recientes varían a lo largo de Europa occidental y central. Por ejemplo, en Bulgaria, la República Checa, Hungría, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, las tasas de casos diagnosticados de infección por el VIH se duplicaron entre 2000 y 2009. Por otro lado, los diagnósticos de nuevos casos de infección por el VIH disminuyeron más de un 20% en Letonia, Portugal y Rumania.

América Latina

- Por lo general, las epidemias de VIH en América Latina permanecen estables.
 - Entre 2001 y 2010, la prevalencia del VIH en adultos en la región permaneció invariable al 0,4%.
 - Desde 2001, se han producido cerca de **100.000** [73.000–140.000] nuevas infecciones por el VIH al año.
- Como el número de muertes relacionadas con el sida disminuye gracias a un mayor acceso al tratamiento antirretrovírico capaz de salvar vidas, el número total de personas que viven con el VIH está aumentando.
 - En 2010, cerca de **1,5 millones** [1,2–1,7 millones] de personas vivían con el VIH, en comparación con **1,3 millones** [1,0–1,7 millones] en 2001.
- Más de un tercio (36%) de los adultos que vivían con el VIH en esta región en 2010 eran mujeres.

El Caribe

- En el Caribe, la epidemia se ha frenado considerablemente desde mediados de los 90.
 - Un número estimado de **12.000** [9.400–17.000] adultos y niños contrajeron el VIH en 2010, en comparación con los **19.000** [16.000–22.000] de 2001.
 - Desde 2001, las nuevas infecciones por el VIH han descendido cerca de un 25% en la República Dominicana y Jamaica, y cerca de un 12% en Haití.
- Las muertes relacionadas con el sida se redujeron de forma significativa, de **18.000** [14.000–22.000] en 2001 a **9.000** [6.900–12.000] en 2010.
- El aumento del acceso a los servicios de prevención del VIH para las mujeres embarazadas ha dado lugar a una marcada disminución en el número de niños que contraen el VIH y de muertes infantiles relacionadas con el sida.

- A pesar de los progresos realizados, el Caribe sigue teniendo la segunda prevalencia regional del VIH más alta (0,9%) después de África subsahariana.
- Las relaciones sexuales sin protección siguen siendo el principal modo de transmisión en la región.

Oriente medio y África septentrional

- Durante los últimos diez años, se ha registrado un aumento en el número de personas que viven con el VIH en la región. Los nuevos casos de infección por el VIH y las muertes relacionadas con el sida también están ascendiendo.
 - El número estimado de adultos y niños que viven con el VIH ascendió de **320.000** [190.000–450.000] en 2001 a **470.000** [350.000–570.000] en 2010.
 - El número estimado de adultos y niños que contrajeron el VIH aumentó de **43.000** [31.000–57.000] en 2001 a **59.000** [40.000–73.000] en 2010.
 - El número de muertes relacionadas con el sida en adultos y niños en la región se incrementó de cerca de **22.000** [9.700–38.000] en 2001 a **35.000** [25.000–42.000] en 2010.
- La prevalencia del VIH en la región, estimada en un 0,2% en 2010, sigue siendo baja –excepto en Djibouti y Sudán del Sur, donde la epidemia se está generalizando (la prevalencia nacional del VIH supera el 1%).