

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Доклад ЮНЭЙДС к Всемирному дню борьбы со СПИДом 2011 года

Страны Африки к югу от Сахары

- В 2010 году приблизительно 68% всех людей, живущих с ВИЧ, проживало в странах Африки к югу от Сахары. В данном регионе проживает лишь 12% мирового населения.
- Число людей, живущих с ВИЧ, в Южно-Африканской Республике (по оценкам, составляющее 5,6 миллиона человека) выше, чем в любой другой стране мира.
- Со времени разгара эпидемии в 1997 году общее число новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе уменьшилось более чем на 26%: с **2,6 миллиона** [2,4-2,8 миллиона] до **1,9 миллиона** [1,7-2,1 миллиона].
 - В 22 странах Африки к югу от Сахары в период с 2001 по 2009 год уровень новых случаев ВИЧ-инфекции снизился более чем на 25%.
 - Тем не менее, в 2010 году на регион приходилось 70% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в мире.
- С 1998 года в Африке к югу от Сахары СПИД уносил как минимум миллион жизней в год. В 2010 году почти половина всех смертей вследствие СПИДа была зарегистрирована на юге Африки.
- Наиболее заметное в мире расширение охвата антиретровирусной терапией отмечено в Африке к югу от Сахары, где только за период с 2009 по 2010 год этот показатель увеличился на 20%.
 - Расширение доступа к бесплатной антиретровирусной терапии в регионе привело к стабильному снижению смертности, связанной со СПИДом.

Азия

- В Азии распространённость ВИЧ по-прежнему существенно ниже, чем в ряде других регионов.
 - В 2010 году с ВИЧ жило приблизительно 0,1% населения Восточной Азии, и 0,3% – в Южной и Юго-Восточной Азии.
 - Тем не менее, ввиду своей абсолютной численности население Азии является второй по размерам группой людей, живущих с ВИЧ, в мире.
- В Южной и Юго-Восточной Азии оценочное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей снизилось с примерно **380 000** [340 000–420 000] в 2001 году до **270 000** [230 000–340 000] в 2010 году.
 - Со времени разгара эпидемии в 1996 году число новых случаев ВИЧ-инфекции в Южной и Юго-Восточной Азии снизилось на 40%.

- В Восточной Азии незначительно увеличилось число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей с **74 000** [54 000–100 000] в 2001 году до **88 000** [48 000–160 000] в 2010 году.
- Распространённость ВИЧ среди ключевых групп населения (работники секс-бизнеса, ПИН, МСМ) остаётся высокой в ряде стран Азии, и со временем вирус распространился на другие группы населения.

Океания

- По оценкам, в конце 2010 года число людей, живущих с ВИЧ, в Океании достигло **54 000** [48 000–62 000], что примерно на 34% больше оценочного показателя за 2001 год.
- С 2001 года число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа в регионе снизилось.
 - В период с 2001 по 2010 год ежегодное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей снизилось с **4000** [3300–4600] до **3300** [2400–4200].
 - В этот же период снизилось число смертей в связи со СПИДом с **1800** [1300–2900] до **1600** [1200–2000].

Восточная Европа и Центральная Азия

- С 2001 года в Восточной Европе и Центральной Азии наблюдался 250-процентный рост числа людей, живущих с ВИЧ.
 - Оценочное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, в регионе возросло с **410 000** [340 000–490 000] в 2001 году до **1,5 million** [1,3–1,7 миллиона] в 2010 году.
- На Россию и Украину приходится около 90% бремени региональной эпидемии, хотя в значительной доле случаев передача инфекции происходит среди половых партнёров лиц, употребляющих инъекционные наркотики.
- За последние десять лет в регионе существенно увеличилось число смертей вследствие СПИДа:
 - По оценкам, в 2010 году **90 000** [74 000–110 000] взрослых и детей умерло от СПИДа, по сравнению с **7800** [6000–11 000] в 2001 году.
- Употребление инъекционных наркотиков остаётся основной причиной заражения ВИЧ в регионе.

Северная Америка, Западная и Центральная Европа

- Эпидемия ВИЧ в этих двух регионах остаётся на относительно стабильном уровне.
 - В период с 2001 по 2010 год в Западной и Центральной Европе годовое число взрослых и детей, вновь инфицированных ВИЧ, оставалось неизменным на уровне **30 000** [22 000–39 000].

- В Северной Америке наблюдалось незначительное увеличение годового числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей с **49 000** [34 000–70 000] в 2001 году до **58 000** [24 000–130 000] в 2010 году.
- По оценкам, в 2010 году в обоих регионах общее число людей, живущих с ВИЧ, достигло 2,2 миллиона, или примерно на треть (34%) больше чем в 2001 году.
 - Этот рост отражает широкую доступность антиретровирусной терапии, что привело к значительному снижению смертности в связи со СПИДом.
- Последние тенденции в странах Западной и Центральной Европы отличаются. Например, за период с 2000 по 2009 год число диагностированных случаев ВИЧ в Болгарии, Чешской Республике, Венгрии, Литве, Словакии и Словении увеличилось вдвое. В Латвии, Португалии и Румынии число новых диагнозов ВИЧ уменьшилось более чем на 20%.

Латинская Америка

- Эпидемии ВИЧ в Латинской Америке в целом стабильны.
 - В период с 2001 по 2010 год распространённость ВИЧ среди взрослых в регионе сохранилась на уровне 0,4%.
 - По оценкам, с 2001 года годовое число новых случаев ВИЧ-инфекции составляло **100 000** [73 000–140 000].
- По мере снижения смертности в связи со СПИДом благодаря расширению доступа к спасательной антиретровирусной терапии общее число людей, живущих с ВИЧ, увеличивается.
 - По оценкам, в 2010 году с ВИЧ жило **1,5 миллиона** [1,2–1,7 миллиона] человек, что выше показателя 2001 года, составлявшего **1,3 миллиона** [1,0–1,7 миллиона].
- В 2010 году более трети (36%) взрослых, живущих с ВИЧ, в регионе составляли женщины.

Карибский регион

- С середины 1990-х годов эпидемия в Карибском регионе значительно замедлила свои темпы.
 - По оценкам, в 2010 году **12 000** [9400–17 000] взрослых и детей были вновь инфицированы ВИЧ, что ниже показателя 2001 года, составлявшего **19 000** [16 000–22 000].
 - С 2001 года число новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось примерно на 25% в Доминиканской Республике и на Ямайке и примерно на 12% в Гаити.
- Значительно сократилось число смертей вследствие СПИДа с **18 000** [14 000–22 000] в 2001 году до **9000** [6900–12 000] в 2010 году.
- Расширение доступа к услугам по профилактике ВИЧ для беременных женщин привело к резкому уменьшению числа детей, вновь инфицированных ВИЧ, и числа смертей вследствие СПИДа среди детей.

- Несмотря на достигнутый прогресс Карибский регион остаётся вторым по распространённости ВИЧ (0,9%) регионом после Африки к югу от Сахары.
- Незащищенные половые контакты остаются основным путём передачи ВИЧ в регионе.

Ближний Восток и Северная Африка

- За последние десять лет в регионе наблюдалось увеличение числа людей, живущих с ВИЧ. Также отмечается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа.
 - По оценкам, число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, увеличилось с **320 000** [190 000–450 000] в 2001 году до **470 000** [350 000–570 000] в 2010 году.
 - Оценочное число взрослых и детей, вновь инфицированных ВИЧ, возросло с **43 000** [31 000–57 000] в 2001 году до **59 000** [40 000–73 000] в 2010 году.
 - Число смертей в связи со СПИДом среди взрослых и детей в регионе увеличилось с примерно **22 000** [9700–38 000] в 2001 году до **35 000** [25 000–42 000] в 2010 году.
- Распространённость ВИЧ в регионе остаётся низкой на уровне 0,2% в 2010 году, за исключением Джибути и Южного Судана, где эпидемия приобретает генерализованный характер (распространённость ВИЧ по стране превышает 1%).