

HOJA DE DATOS

Asia

Las epidemias de VIH en Asia siguen en gran parte estables

- La mayoría de las epidemias nacionales de VIH de la región parecen haberse estabilizado.
- Alrededor de 4,9 millones [4,5 millones-5,5 millones] de personas vivían con el VIH en 2009, una cifra muy parecida a la de cinco años antes.
- Un número estimado de 300 000 [260 000-340 000] personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2009, en comparación con las 250 000 [220 000-300 000] defunciones de 2001.

Progreso realizado en la respuesta al VIH entre niños

- El acceso más amplio a los servicios que previenen la transmisión materno-infantil del VIH ha generado un descenso considerable en las nuevas infecciones por el VIH entre niños.
- Un número estimado de 22 000 [15 000-31 000] niños de 0 a 14 años se infectaron con el VIH en 2009, esto es, una disminución del 15% respecto de los 26 000 [18 000-38 000] estimados en 1999.
- Las defunciones relacionadas con el sida entre niños disminuyeron de 18 000 [11 000-25 000] en 2004 a 15 000 [9 000-22 000] en 2009, lo que representa una disminución del 15%.

Progreso heterogéneo en las nuevas infecciones por el VIH

- Un estimado de 360 000 [300 000-430 000] personas se infectaron con el VIH en 2009, en comparación con las 450 000 [410 000-500 000] infecciones producidas en 2001, esto es, una reducción del 20% en un lapso de ocho años.
- En la India, Nepal y Tailandia, la tasa de incidencia de nuevas infecciones por el VIH descendió más de un 25% entre 2001 y 2009.
- Entre 2001 y 2009, la tasa de incidencia de nuevas infecciones por el VIH en Bangladesh y las Filipinas —países con niveles relativamente bajos de epidemia— aumentó más de un 25%.

Los patrones de la epidemia de VIH varían entre y dentro de los países

- Las tendencias generales en la epidemia ocultan variaciones importantes. En China, por ejemplo, cinco de las 22 provincias del país albergan al 53% de las personas que viven con el VIH.
- En la provincia indonesia de Papua, los niveles de infección por el VIH son 15 veces más altos que el promedio nacional.

La visión del ONUSIDA: Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación. Cero muertes relacionadas con el sida.

- Tailandia es el único país de Asia donde se registra una prevalencia del VIH cercana al 1%.
- En Camboya, la prevalencia del VIH en adultos descendió del 1,2% [0,8%-1,6%] en 2001 al 0,5% [0,4%-0,8%] en 2009.

Las poblaciones clave son cruciales para las epidemias de VIH de la región

- Las epidemias de Asia siguen concentradas principalmente entre usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y profesionales del sexo.
- Alrededor del 16% de las personas que se inyectan drogas en Asia viven con el VIH. En algunos países, esta estimación es considerablemente más alta: del 30% al 50% en Tailandia y del 32% al 58% en Viet Nam.
- Se ha comunicado una elevada prevalencia entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en la región: 29% en Myanmar, 5% en Indonesia y entre el 7% y el 18% en partes la región meridional de la India.
- Casi una de cada cinco (18%) de las profesionales del sexo encuestadas en Myanmar obtuvo resultados positivos en las pruebas del VIH a mediados de los años 2000.

Contacto: ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, es una asociación innovadora de las Naciones Unidas que lidera e inspira al mundo para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. Obtenga más información en unaids.org.