

AIDE-MÉMOIRE

Asie

Les épidémies de VIH demeurent essentiellement stables en Asie

- Les épidémies nationales de VIH de la région semblent pour la plupart s'être stabilisées.
- On estimait à 4,9 millions [4,5 millions–5,5 millions] le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2009, chiffre qui n'a pratiquement pas changé en cinq ans.
- On estimait à 300 000 [260 000–340 000] le nombre de personnes décédées de maladies liées au sida en 2009, contre 250 000 [220 000–300 000] en 2001.

Progrès de la riposte au VIH parmi les enfants

- L'élargissement de l'accès à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH a permis de réduire de manière significative les nouvelles infections parmi les enfants.
- On estimait à 22 000 [15 000–31 000] le nombre d'enfants (0-14 ans) nouvellement infectés par le VIH en 2009 – soit 15% de moins qu'en 1999 (26 000 [18 000–38 000]).
- Les décès d'enfants liés au sida ont diminué de 18 000 [11 000–25 000] en 2004 à 15 000 [9 000–22 000] en 2009, ce qui correspond à une baisse de 15%.

Progrès contrastés sur le front des nouvelles infections à VIH

- On estimait à 360 000 [300 000–430 000] le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH en 2009, contre 450 000 [410 000–500 000] en 2001, soit une diminution de 20% en huit ans.
- En Inde, au Népal et en Thaïlande, le taux d'incidence des nouvelles infections à VIH a baissé de plus de 25% entre 2001 et 2009.
- Entre 2001 et 2009, le taux d'incidence des nouvelles infections à VIH a augmenté de plus de 25% au Bangladesh et aux Philippines – pays dont les niveaux épidémiques sont relativement faibles.

Les caractéristiques des épidémies de VIH varient entre et au sein des pays

- Les tendances générales de l'épidémie masquent d'importantes variations. En Chine, par exemple, 5 des 22 provinces du pays abritent 53% des personnes vivant avec le VIH.
- Dans la province indonésienne de Papouasie, les niveaux d'infection à VIH sont 15 fois plus élevés que la moyenne nationale.
- La Thaïlande est le seul pays asiatique qui affiche une prévalence du VIH proche de 1%.
- Au Cambodge, la prévalence du VIH chez les adultes a diminué de 1,2% [0,8%–1,6%] en 2001 à 0,5% [0,4%–0,8%] en 2009.

Les populations clés sont au centre des épidémies de la région

- Les épidémies de VIH d'Asie restent largement concentrées parmi les consommateurs de drogues injectables, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe.
- Environ 16% des personnes qui consomment des drogues injectables en Asie sont séropositives au VIH. Dans certains pays, cette estimation peut se révéler considérablement plus élevée : 30%–50% en Thaïlande et 32%–58% au Vietnam.
- On constate une prévalence élevée du VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans plusieurs pays de la région : 29% au Myanmar, 5% en Indonésie et entre 7% et 18% dans certaines régions d'Inde septentrionale.
- Près d'une professionnelle du sexe sur cinq (18%) interrogée au Myanmar a été diagnostiquée séropositive au VIH au milieu des années 2000.

Contact : ONUSIDA Genève | tel. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

L'**ONUSIDA** est un partenariat innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui en matière de VIH. Plus d'informations sur le site unaids.org.