

Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Panamá

Monitoreo Global del Sida 2019



Contenido

- I. Total - Objetivos de Acción acelerada
- II. Cascada de pruebas y tratamiento del VIH - Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020
- III. Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH - Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018
- IV. Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave - Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)
- V. Género; Estigma y discriminación - Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020
- VI. Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva - Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año
- VII. Protección social - Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020
- VIII. Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria - Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020
- IX. Gasto relativo al VIH - Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

- X. Empoderamiento y acceso a justicia - Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos
- XI. SIDA fuera del aislamiento - Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Total


Objetivos de Acción acelerada

Resumen de avances

Para finales del 2020 el país ha logrado detener el avance de la Epidemia del sida, disminuyendo significativamente las nuevas infecciones.


3.1 Incidencia del VIH, Panamá (2016-2018)

Número de personas que contraen el VIH en el periodo sobre el que se informa por cada 1.000 personas no infectadas por el virus




1.7 Mortalidad relacionada con el Sida, Panamá (2016-2018)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, Panamá (2015)

Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que respondieron "No" a : la pregunta 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"; la pregunta 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"



Cascada de pruebas y tratamiento del VIH

Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

Resumen de avances

Avances logrados en este compromiso:

- Se han comprado pruebas para ofertar las pruebas en forma gratuita a la población en más alto riesgo y Población General
- Se ha puesto en marcha el Decreto de Gratuidad de las Pruebas de VIH para todas las poblaciones a nivel nacional, lo que nos permite diagnosticar y tratar de manera oportuna a los que viven con la condición de VIH
- Se ha mejorado el algoritmo diagnóstico con 2 pruebas rápidas.
- Se está implementando la estrategia Rapid (diagnosticar y tratar de inmediato)
- Se han incrementado la digitación con de los pacientes de terapia para mantener un mejor registro.
- Se ha actualizado la guía de tratamiento de los pacientes que reciben terapia antirretroviral.
- se ha incrementado la compra de PCR en tiempo real para el tamizaje a todos los niños expuestos.

Porcentaje de personas que viven con el VIH que conocen su estado de VIH al final del período de notificación

1.1 En relación al porcentaje de personas que viven con el VIH y que conocen su estado serológico, el año 2018 aún no lo podemos calcular hasta que estén disponibles las estimaciones nacionales, sin embargo, contamos con el número de total de 17,405 personas que se realizaron las pruebas de VIH y conocen su resultado.

1.2 Porcentaje y número de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH a la conclusión del periodo del que se informa

Con respecto al Porcentaje de adultos y niños que reciben terapia antirretroviral, en el año 2018 se reporta con un 81%, cifra que fue calculada a partir de los datos reales de país, utilizando como numerador a los 14,171 personas que recibían TARV hasta diciembre de 2018 y el denominador fueron los 17,405 personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH, por 100 ($14171/17405 \times 100$), el estudio de la cascada del año 2016, este pilar arrojó un 52%. Para el denominador en el estudio de la cascada, se utilizó la estimación baja de las Personas que viven con VIH en el país (23,000). Es importante señalar que el uso de los datos reales del país, permite tener una visión más real de la situación nacional.

1.3 Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio

Al observar el porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio, encontramos que el indicador se reporta con un 84.4%. Este valor representa un incremento de más de 10 puntos porcentuales con respecto a lo divulgado en el estudio de la cascada del año 2016.

Para lograr este avance en el país, en todas las Clínicas de terapia Antirretrovirales se enfatiza y refuerza la adherencia al tratamiento. Además en el marco del desarrollo del Proyecto de la Subvención del Fondo Mundial, con el apoyo de CAPACITY PROJECT y PASCA, se ha continuado con el nombramiento de promotores que ayudan en la promoción de la adherencia al tratamiento con sus pares y además participan en el rescate de las personas que han abandonado la terapia.

1.4

1.5 Porcentajes de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4 <200 células / mm³ y <350 células / mm³ durante el período del informe

En el año 2018 encontramos que el porcentajes de personas que viven con el VIH con el recuento inicial de células CD4:

- <200 células / mm³, fue de 36.2% lo que representa una leve disminución en la búsqueda tardía de los servicio de salud, en comparación con al año 2017 que reflejó un 42.6%. Este porcentaje se calculó utilizando como numerador las 853 usuarios que resultaron con CD4 menor de 200 y denominador fueron los 2,355 personas que vive con VIH con un recuento inicial de CD4. Esta situación mejoró con la implementación de la estrategia Rapid (Diagnosticar y tratar), en muchas de las Clínicas de Terapia Antirretrovirales. Estos datos revelan que aún hay muchas personas que están acudiendo de manera tardía a buscar atención de salud, lo que nos lleva a concluir que debemos continuar intensificando la búsqueda de las personas que viven con VIH, para hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno
- En el año 2018 un 48.4% de los usuarios presentaron un recuento inicial de células CD4 <350 células / mm³. Lo que demuestra que en el 2018 se ha presentado una disminución en la búsqueda tardía de servicios de salud, en comparación con el año

2017 que el 68.3% de usuario presentaron un recuento inicial de células CD4 menor de 350. Esta mejoría evidente es resultado de las estrategias implementadas, descritas anteriormente.

1.6 Porcentaje de CTARV que presentaron desabastecimiento de uno o más medicamentos antirretrovirales requeridos durante un período definido

El Porcentaje de Centros de tratamiento que presentaron desabastecimiento de uno o más medicamentos antirretrovirales en el año 2018, fue del 100% , este porcentaje incrementó en relación con el 2017 que reveló un 88.8%. Esta situación es preocupante por lo que se están tomando las medidas para subsanarla

1.7 Número total de personas que han muerto de causas relacionadas con el SIDA por 100, 000 habitantes

1.7 Número total de personas que han muerto de causas relacionadas con el SIDA por 100000 habitantes

El número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el SIDA en los últimos 3 años ha sido de:

- 508 en el año 2015
- 510 en el año 2016
- 510 en el año 2017
- 430 en el año 2018

El número de personas muertas por causas relacionadas con el SIDA, en el año 2018, ha disminuido en relación con años anteriores. Esta situación podemos atribuirla a que hemos incrementado en todo el país la estrategia de diagnosticar y tratar de inmediato.

Preguntas de políticas (2018)

¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH...?:

a) Son obligatorias antes del matrimonio

Sí

b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia

No

c) Son obligatorias para ciertos grupos

No

¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapias antirretrovirales en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Sanidad y cuál es la situación de implementación?

No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de células CD4; Implementado en todo el país (>95% de los centros de tratamiento)

¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes


Sí, plenamente implementada

b) Para niños

Sí, plenamente implementada


1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral, Panamá (2011-2018)

Número de personas que reciben terapias antirretrovirales a la conclusión del periodo sobre el que se informa




1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses, Panamá (2011-2018)

Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio




1.5 Diagnóstico tardío del VIH, Panamá (2018)

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm³ durante el periodo del que se informa



1.7 Mortalidad relacionada con el Sida por cada 100.000 personas, Panamá (2016-2018)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

Resumen de avances

Avances logrados en este compromiso:

- Se ha divulgado el decreto de gratuidad de la prueba de VIH a mujeres embarazadas, así como la gratuidad de la atención de la embarazada durante el embarazo, parto y puerperio, además de la gratuidad de la atención del niño de 0 a 5 años de edad
- El Programa Nacional de ITS/VIH y Hepatitis Virales (PNIVH) ha garantizado la realización de la prueba VIH sífilis dúo.
- Para mejorar el control prenatal el PNIVH ha provisto a las mujeres con VIH en edad fértil método de planificación familiar.
- El país continua garantizando la triple terapia a la mujer después del parto, o sea la estrategia B+

2.1 Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento

En el año 2018, EL 97,8% el 90% de los niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que recibieron pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento.

En este indicador es importante explicar que en el 2018 hubo un total de 188 niños nacidos de mujeres VIH positivas, con las pruebas virológicas realizadas de la siguiente manera

- 182 se hicieron la prueba de VIH a los 2 meses (1 falleció con prueba negativa)

- 4 se la hicieron en otros meses y fueron negativos
- 2 no se la realizaron

En el 2018, este indicador presentó un incremento de pruebas virológicas realizadas durante los 2 primeros meses de vida, a niños expuestos al VIH, en comparación con el año anterior se presentó con un 90%.

2.2 Porcentaje estimado de niños recién infectados con el VIH de la transmisión de madre a hijo entre Mujeres que viven con VIH en los últimos 12 meses

En el 2018 tuvimos un total de 5 niños infectados con el VIH de transmisión materno infantil

2.3 Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con VIH que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de la transmisión materno infantil del VIH

En el 2018 el 92.4% de las mujeres embarazadas que viven con VIH recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de la transmisión materno infantil del VIH. El 38 % de estas mujeres, iniciaron la terapia antirretrovírica durante el embarazo, el 62% ya estaba recibiendo TARV antes de embarazarse

El indicador fue calculado utilizando como numerador las 172 embarazadas que recibieron los ARVS para prevenir la transmisión materno infantil del VIH y el denominador son la 186 de mujeres que vive con VIH que dieron a luz, por 100 ($172/186 \times 100$).

En este año hubo una disminución de 95% a 92.4%, de embarazadas VIH positivas que no recibieron profilaxis con Antirretrovirales, en relación al año 2017.

2.4 Porcentaje de mujeres que acceden a servicios de atención prenatal que fueron sometidas a la prueba de sífilis, que tuvieron resultado positivo, y que recibieron tratamiento

En el año 2018 el porcentaje de mujeres que acceden a servicios de atención prenatal, sometidas a prueba de sífilis fue de 65%, cifra que refleja una reducción considerable en comparación con el año 2017, que resultó con el 92.7%.

2.5 Porcentaje de casos notificados de sífilis congénita (nacidos vivos y nacidos muertos)

En relación al porcentaje de casos notificados de sífilis congénita en el 2018 se ha mantenido en 0.5% al igual que el año anterior. Además se ha mantenido la mejoría en el reporte de casos al departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

2.6 Porcentaje de embarazadas que se sometió a la prueba del VIH y conoce los resultados

Para este reporte el porcentaje de embarazadas que se sometió a la prueba del VIH y conoce los resultados fue de 86.6%, en el año 2018. Este indicador ha incrementado, de 74.4% a 86.6%, debido a que hemos mejorado nuestro sistema de registro de los datos.

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?:

Sí

¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten? ¿En caso positivo, cuál es la situación de implementación de esta política?

Tratamiento universal, independientemente de la edad; Implementada en todo el país (>95% de los centros de tratamiento)


2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Panamá (2017-2018)

Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento



2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Panamá (2017-2018)


Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento



↑ 90.0% (2017)


2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH, Panamá (2011-2018)

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores




2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Panamá (2011-2018)

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH



2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Panamá (2017-2018)


Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH



↓ 95.0% (2017)


2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Panamá(2018)

Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis




2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Panamá (2018)

Porcentaje de mujeres embarazadas con una prueba positiva para la sífilis




2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos), Panamá (2013-2018)

Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)



2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas, Panamá (2017-2018)

Porcentaje de mujeres embarazadas con estatus de VIH conocido



↑ 74.1% (2017)

Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)

Resumen de avances

Avances logrados en este compromiso:

- El ministerio de salud compra y distribuye condones en las clínicas amigables y a las Clínicas de Terapia Antirretrovirales.
- Se tienen campañas de vinculación sobre conocimiento de VIH y ITS con apoyo de social civil.
- Se está culminando la guía de atención de la población Clave que recibe servicios de salud en las Clínicas Amigables (CLAM)
- Se sigue trabajando con los promotores de vinculación como los HSH y Mujeres Trans.
- Se continua con la contratación de los digitadores para mejorar el registro de los pacientes en las TARV.

- Se distribuyen preservativos en población Clave y se han instalado equipos de CD4 y CV para los usuarios de población Clave y los privados de libertad
- Se realizan Pruebas de Sífilis y VIH gratuitas para los usuarios de la población clave

3.1 Incidencia del VIH

Número de personas que contraen la infección por VIH durante el periodo sobre el que se informa

El Número de personas que contraen la infección por VIH en el 2018 por cada 1,000 personas no infectadas por el virus, fue de 1,318 y se comportó de la siguiente manera según grupo etario:

- De 0 – 14 años: 0.013
- De 15 – 24 años: 0.57
- De 25 – 49 años: 0.56
- De 50 y más: 0.1

3.2 Estimaciones sobre el Tamaño de grupos de Población clave

Estimación del tamaño de población:

- TS: 8,323
- HSH: 46,966
- Trans: 3,100

3.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo - Panamá - 2017

En el año 2018 la cantidad de personas profesionales del sexo que se realizaron las pruebas de VIH aumentó considerablemente en relación al año anterior en el grupo de las Trabajadoras sexuales femeninas (TSF) y los hombres TS, el cual fue de 1,847 y 24 respectivamente. En el 2017, 1,031 TSF y 12 hombres TS se hicieron las pruebas de VIH. Sin embargo, el grupo de las personas trans trabajadoras sexuales tamizadas en el 2017, fue de 135 y en el año 2018 de 33,

La Prevalencia total del VIH entre profesionales del sexo se reportó con un 0.57% en el 2018 y el año anterior de 4.6%, por las razones antes mencionadas.

3.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 2017

En el año 2018 hubo un aumento en el número de HSH de que se realizaron la prueba de VIH, de 4,641 a 7,525; sin embargo, hubo una disminución de la cantidad de pruebas positivas, de 564 (en el 2017) a 510 (en el 2018). Pero la prevalencia del VIH en este grupo

de personas disminuyó de 12.1% a 6.7%, ya que el número de pruebas realizadas fue mayor.

3.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero.

Porcentaje de grupos de población clave específicos que viven del VIH

La Prevalencia del VIH entre las personas transgénero, en el año 2017 fue de 29.6% y en el 2018 de 16.5% lo que nos demuestra que hubo una disminución. Las diferencias significativas de las cifras se debe a que, en el 2018 la cantidad de personas trans que se realizaron las pruebas de VIH fue mayor, pero los resultados positivos fueron menores.

3.3E. Prevalencia del VIH entre los presos

Porcentaje de reclusos /detenidos que viven con el VIH

El porcentaje de personas privadas de libertad que vive con VIH, en el año 2017 fue de 0.8% y en el 2018 de 1.07%, puesto que hubo mayor población tamizada. Este indicador se construye utilizando como numerador, el número total de privadas de libertad con pruebas de VIH positiva y el denominador fue el número total de privadas de libertad que se realizaron las pruebas de VIH.

3.4A Prueba de VIH en población clave

El Porcentaje Total de profesionales del sexo que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses, o que conocen su estado actual de VIH fue de 96.9%. Distribuidos de la siguiente manera:

- Hombres: En este año 28 Hombres TS se hicieron la prueba de VIH, 2 resultaron positivos y 24 de ellos conocen su estado serológico
- Mujeres TS: En el año 2018 1,893 MTS se realizaron la prueba de VIH, 3 resultaron positivas y 1,847 conocen su estado serológico al VIH
- Trans: En el año 2018 43 Personas trans se realizaron la prueba de VIH, 6 resultaron positivas y 33 conocen su estado serológico al VIH

3.4B. Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

El Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han hecho la prueba del VIH en los últimos 12 meses o saben que viven con el VIH, según lo que respondieron a la pregunta #1 fue de 99.2%. En este indicador observamos un aumento de 94.4% (en el 2017) a 99.2% (en el año 2018); esto sucede básicamente por las mismas razones señaladas en el indicador previo.

3.4D. Conocimiento del estado serológico respecto del VIH entre las personas transgénero

El Porcentaje de personas transgénero que se han hecho la prueba del VIH en los últimos 12 meses o saben que viven con el VIH, para el año 2018 fue de 95.9%, esta cifra se ha mantenido estable, puesto que el año anterior se presentó con 95.5%

3.5A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH - Panamá – 2018

La Cobertura total de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH, en el año 2018, fue del 70% y se distribuye según grupo, de la siguiente manera:

- Hombres: 40% (2 de 5)
- Mujeres: 100% (4 de 4)
- Trans: 72.7% (8 de 11)

3.5B. Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

En el año 2018 este indicador se reporta con 93.7% de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores.

3.5E. Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores

En relación al Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores, en el año 2018 reportamos este indicador con un 92.4% (135/1146X100).

3.6.A – Uso del preservativo entre grupos de población clave

En relación al uso de preservativos en población clave, en los años 2017 y 2018, los porcentajes se comportan de esta manera:

- Profesionales del sexo: total 93.7%

Profesionales del Sexo	Hombres	Mujeres	Trans
2017	87.5%	93.8%	93.6%
2018	87.5%	97.7%	72%

En el año 2018 hubo un incremento significativo del Número de mujeres profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente, en comparación con el año 2017, los Hombres se mantuvieron igual, pero el grupo trans disminuyó; por lo que debemos reforzar las acciones en este grupo.

- Los HSH: fue de 80.6% en el 2018 y 75% en el 2017

En el año 2018, se ha incrementado el número y porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina, pero aún debemos continuar reforzando esta medida de prevención

- **Personas Trans: 80% en el 2018 y 93.9% en el 2017**

3.7 A-E Cobertura de los programas de prevención del VIH entre grupos de población clave

1. Distribución de Lubricantes y condones
 - Trabajadores del sexo: 99%
 - HSH: 97.6%
 - Personas trans:97.1%
2. Asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras
 - Trabajadores del sexo: 99%
 - HSH: 97.6%
 - Personas trans: 97.1%
3. Pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual realizadas en los últimos tres meses
 - Trabajadores del sexo: 98.7%
 - HSH: 94.4%
 - Personas trans:93.6%
4. reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuente
 - Trabajadores del sexo: 99%
 - HSH: 97.7%
 - Personas trans:97%

3.11. Sífilis activa entre profesionales del sexo

En el año 2018, el número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa han disminuido en relación al año anterior, a pesar de haber tamizado más profesionales del sexo, situación que puede deberse a que en el año 2018 se tamizaron una menor cantidad de hombres y personas trans profesionales del sexo, y estos dos grupos fueron los que presentaron una mayor cantidad de casos de sífilis el año anterior.

En los años 2017 y 2018, el porcentaje de profesionales del sexo con sífilis, según población fue la siguiente:

- Hombres: 2017 23.5% y 2018 3.7%
- Mujeres: 2017 1.27% y 2018 8%
- Trans: 2017 27.8% y 2018 12%

3.12. Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

En este año se presentó una reducción en el porcentaje de HSH con sífilis activa de 18.7% (en el año 2017) a 15.2% (en el año 2018), a pesar de que hubo más HSH con pruebas de sífilis reactivas. La reducción en el porcentaje es debido a que hubo mayor cantidad de HSH a los que se les realizaron pruebas de sífilis.

3.13. Programas de prevención del VIH en prisiones

Se cuenta con programas de realización de pruebas de VIH en las prisiones, en coordinación con las clínicas de atención de los centros penitenciarios, las Clínicas amigables y algunas ONG's.

El Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos fue de 0.85% y el 93.7% recibe terapia Antirretroviral.

Preguntas de políticas : Grupos de población clave (2018)

Criminalización y/o persecución de poblaciones claves

Personas transgénero

No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

El trabajo sexual no está sujeto a normas punitivas y no está penalizado

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

No existe legislación específica al respecto

¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal?

La legislación permite la posesión de cierta cantidad de drogas

Protecciones legales para grupos de población clave

Personas transgénero

Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo, Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base

Profesionales del sexo

El trabajo sexual está reconocido como trabajo

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base

Personas que usan drogas inyectables

No


Preguntas de políticas : PrEP (2018)

¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP oral en las directrices nacionales de su país?


No, no se han desarrollado las directrices

3.1 Incidencia del VIH, Panamá (2018)

Número de personas que contraen el VIH en el periodo sobre el que se informa por cada 1.000 personas no infectadas por el virus




3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave, Panamá




3.3 Prevalencia del VIH entre grupos de población clave, Panamá (2011-2018)

Porcentaje de grupos de población clave específicos que viven del VIH




3.4 Pruebas de VIH entre poblaciones clave, Panamá

Porcentaje de personas de una población clave que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH




3.5 Cobertura de la terapia antiretroviral entre las personas que viven con el VIH entre grupos de población clave, Panamá

Porcentaje de personas que viven con el VIH en un grupo de población clave que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores




3.6 Uso del preservativo entre grupos de población clave, Panamá (2011-2018)

Porcentaje entre los integrantes de un grupo de población clave que reportan haber utilizado el preservativo en la última ocasión en que tuvieron relaciones sexuales




3.7 Cobertura de los programas de prevención del VIH entre grupos de población clave, Panamá

Porcentaje de personas de un grupo de población clave que dan cuenta de haber recibido un conjunto combinado de intervención para la prevención del VIH




3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo, Panamá (2011-2018)

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa




3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Panamá (2011-2018)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa



3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones, Panamá (2018)

Programas de prevención y tratamiento del VIH ofrecidos a personas privadas de libertad durante la detención



Género; Estigma y discriminación

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?

Sí

¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica?

Sí


¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia?

- Leyes penales generales que prohíben actos de violencia
- Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por la pertenencia a grupos de población clave
- Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*
- Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo
- Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial

¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?

-

Porcentaje de indicadores del Monitoreo Global del SIDA con datos desglosados por género



5 / 7

Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

Preguntas de políticas (2018)

¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad, de acuerdo con estándares internacionales, en...?

a) La escuela primaria

No

b) La escuela secundaria

No

c) La formación para profesores

Sí

Protección social

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados?

Sí, y están siendo implementados

a) ¿Hace referencia al VIH?

No

b) ¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?

No

c) ¿Reconoce a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?

No

d) ¿Reconoce a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?

No

e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?

No

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?

No

g) ¿Aborda la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?

No

Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social en su país?

Los programas de protección social no incluyen a las personas que viven con el VIH, a grupos de población clave y/o a personas afectadas por el VIH
Falta de información disponible sobre los programas
Procedimientos complicados
Miedo al estigma y a la discriminación
Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como documentos nacionales de identidad
Leyes o políticas que impliquen obstáculos al acceso
Alto desembolso para el individuo
Las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y/o las personas afectadas por el VIH quedan cubiertas por otros programas

Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

Preguntas de políticas (2018)

¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antiretroviral?

No

¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para la operación de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias?

Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH

Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias que trabajen con grupos de población clave

Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios relacionados con el VIH

Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios a grupos de población clave

Se han racionalizado los requisitos sobre la presentación de información para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios relacionados con el VIH

¿Cuántos preservativos y lubricantes se distribuyeron en el anterior año calendario, según tipo de proveedor?

a) Preservativos masculinos:

-

b) Preservativos femeninos:

-

c) Lubricantes:

-

Gasto relativo al VIH

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

Resumen de avances

No contamos con datos nuevos para responder este indicador

Empoderamiento y acceso a justicia

Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

Preguntas de políticas (2018)

En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?

Sí, a escala, a nivel nacional

¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)?

Defensor del Pueblo

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?

Procedimientos de reclamación

Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia?

Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados

SIDA fuera del aislamiento

Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Resumen de avances

10.1. Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

Porcentaje estimado de casos nuevos de tuberculosis en personas seropositivas que recibieron tratamiento tanto para la TB como para el VIH

En relación al número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el año 2018, que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB, para este año se reporta con 363, reflejando un aumento en comparación con el 2017.

10.2. Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa

Número total de personas seropositivas con tuberculosis activa, de los pacientes que se registran por primera vez en la atención para el VIH

El número total de personas viviendo con el VIH recientemente registradas en cuidados para el VIH y con TB activa durante el año 2018 fue de 255, esta cifra puede deberse a que hubo un número considerable de personas diagnosticadas de manera tardía con un recuento inicial de CD4 menor de 200 y 350 células / mm³

Preguntas de políticas (2018)

¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en...?

a) La estrategia, política, plan o directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables

Sí

b) El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida

Sí

c) Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH

Sí

¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?

Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH

Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas que viven con el VIH

Control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH

Profilaxis con cotrimoxazol


Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral

Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral

Vacunación para la hepatitis B ofrecida en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral


10.1 Personas que recibieron tratamiento para el VIH y la tuberculosis, Panamá (2011-2018)

Porcentaje estimado de casos nuevos de tuberculosis en personas viviendo con VIH que recibieron tratamiento tanto para la TB como para el VIH




10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa, Panamá (2015-2018)

Número total de personas que viven con el VIH que tienen TB activa expresado como porcentaje de las que son registradas por primera vez para recibir atención para el VIH (pre-terapia antirretroviral o terapia antirretroviral) durante el periodo del que se informa



10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis, Panamá (2015-2018)

Número de pacientes que han empezado el tratamiento para infecciones latentes de TB, expresado como porcentaje del número total de personas registradas por primera vez en atención para el VIH durante el periodo del que se informa



10.4/10.5 Infecciones de transmisión sexual, Panamá (2013-2018)

Número notificado de hombres con exudado uretral en los últimos 12 meses; Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos



10.6/10.8 Pruebas de hepatitis, Panamá (2015-2018)

Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección de la hepatitis

