

UN LONG CHEMIN RESTE À PARCOURIR

LA RÉPONSE AU VIH
EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE



Sommaire

Afrique occidentale et centrale	2
Bénin	10
Burkina Faso	12
Burundi	14
Cap-Vert	16
Cameroun	18
République centrafricaine	20
Tchad	22
Congo	24
Côte d'Ivoire	26
République démocratique du Congo	28
Guinée équatoriale	30
Gabon	32
Gambie	34
Ghana	36
Guinée	38
Guinée-Bissau	40
Libéria	42
Mali	44
Mauritanie	46
Niger	48
Nigéria	50
Sénégal	52
Sierra Leone	54
Togo	56
Annexe sur les méthodes	59

Afrique occidentale et centrale

D'UN COUP D'ŒIL

1

Les ripostes au VIH en Afrique occidentale et centrale continuent de prendre du retard par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne.

2

La région comptabilise à elle-seule 21 % des nouvelles infections par le VIH dans le monde et 30 % des décès dans le monde dus à une maladie liée au sida.

3

Un plan de rattrapage régional a été mis en œuvre dans la région depuis 2016, qui n'a pas encore impulsé de véritable changement dans la montée en puissance du programme.


4

Des programmes de prévention combinés sur mesure pour les adolescentes, les jeunes femmes et les populations clés constituent une priorité et doivent être mis en œuvre avec une urgence accrue.

5

Les principaux défis humanitaires, notamment les conflits armés, le terrorisme et les effets du changement climatique, accentuent la pression sur les ressources gouvernementales et communautaires.


Couverture du traitement antirétroviral chez les enfants (âgés de 0 à 14 ans) et les adultes (âgés de 15 ans et plus) en Afrique occidentale et centrale en 2017



L'un des grands problèmes auxquels est confrontée l'Afrique occidentale et centrale est l'accès extrêmement réduit aux traitements antirétroviraux pour les enfants. La couverture thérapeutique pour les enfants (âgés de 0 à 14 ans) est globalement inférieure à celle des adultes (âgés de 15 ans et plus) dans le monde, mais les disparités en Afrique occidentale et centrale sont souvent considérables : par exemple, moins d'un enfant sur cinq vivant avec le VIH a accès à la thérapie antirétrovirale au Tchad, au Congo, en Guinée équatoriale, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone.


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE

Nombre de nouvelles infections par le VIH, Afrique occidentale et centrale, 2000-2017




Source : Estimations ONUSIDA 2018.

Nombre de décès liés au sida, Afrique occidentale et centrale, 2000-2017




Source : Estimations ONUSIDA 2018.

Rapport incidence/prévalence, Afrique occidentale et centrale, 1990-2017



Source : Estimations ONUSIDA 2018.


Nombre de nouvelles infections par le VIH et de décès parmi la population séropositive, 1990-2017



Source : Estimations ONUSIDA 2018.

Le taux de nouvelles infections par le VIH et le fardeau du VIH restent élevés en Afrique occidentale et centrale. Le rapport incidence/prévalence dans la région a peu changé depuis 2010 : il était de 0,06 [0,04-0,09] en 2017, soit deux fois plus que le seuil de transition épidémique de 0,03. Les décès dus à des maladies liées au sida dans la région ont diminué de près d'un quart depuis 2010 et le nombre annuel de nouvelles infections par le VIH a diminué de 8 %. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigéria ont représenté ensemble environ 71 % des nouveaux cas d'infection par le VIH dans la région en 2017. Le Nigéria a comptabilisé à lui seul plus de la moitié des cas de nouvelles infections et de décès dus aux pathologies du sida, ce qui reflète en partie la taille de sa vaste population par rapport aux autres pays de la région.

Répartition des nouvelles infections par le VIH, par groupe de population en Afrique occidentale et centrale en 2017




* Aucune donnée rapportée sur les femmes transgenres.

† Les personnes de cette catégorie n'ont signalé aucun comportement à risque lié au VIH.

Source : Analyse spéciale de l'ONUSIDA, 2018.

Répartition des nouvelles infections par le VIH et des décès liés au sida par pays, Afrique occidentale et centrale, 2017



Source : Estimations ONUSIDA 2018.

TABLEAU DE BORD DES LOIS ET POLITIQUES

Pays	Criminalisation des personnes transgenres	Criminalisation du travail du sexe	Criminalisation des actes sexuels de même sexe	Usage ou possession de drogue pour usage personnel et infraction	Consentement parental pour que les adolescents aient accès au test VIH	Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Lois criminalisant la transmission, la non-divulgaration ou l'exposition à la transmission du VIH	Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Test VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes
Bénin				d					
Burkina Faso		a	b	m			c		
Burundi			n						
Cap-Vert			b				c		
Cameroun			b						
République centrafricaine		f							
Tchad			b				c		g
Congo			b				c		
Côte d'Ivoire				h					
République démocratique du Congo		a	b		a		c		
Guinée équatoriale									
Gabon									
Gambie		a	b	i	a		c		j
Ghana									
Guinée									
Guinée-Bissau							c		
Libéria									
Mali									
Mauritanie			e				k		
Niger			b						
Nigéria				o					
Sao Tomé-et-Principe									
Sénégal			p						
Sierra Leone									
Togo				l					

Criminalisation des personnes transgenres
■ Criminalisé et / ou poursuivi
■ Ni criminalisé ni poursuivi
■ Données non disponibles

Criminalisation du travail du sexe
■ Toute criminalisation ou réglementation punitive du travail du sexe
■ Le travail du sexe n'est pas soumis à des réglementations punitives ou n'est pas criminalisé
■ Le problème est déterminé / diffère au niveau sous-national
■ Données non disponibles

Criminalisation des actes sexuels de même sexe
■ Peine de mort
■ Emprisonnement (14 ans - à vie, jusqu'à 14 ans) ou aucune peine spécifiée
■ Des lois pénalisant les actes sexuels entre personnes du même sexe ont été décriminalisées ou n'ont jamais existé, ou il n'existe aucune législation spécifique
■ Données non disponibles

Usage ou possession de drogue pour usage personnel et infraction
■ Détention obligatoire pour des infractions liées à la drogue
■ La possession de drogues à usage personnel est définie comme une infraction pénale ou bien l'utilisation ou le consommation de drogues est une infraction spécifique en droit
■ La possession de drogues à usage personnel est considérée comme une infraction non pénale
■ Données non disponibles

Consentement parental pour que les adolescents aient accès au test VIH
■ Oui, pour les adolescents de moins de 18 ans
■ Oui, pour les adolescents entre 14 et 16 ans
■ Oui, pour les adolescents de moins de 12 ans
■ Non
■ Données non disponibles

Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées
■ Oui
■ Non
■ Données non disponibles

Lois criminalisant la transmission, la non-divulgaration ou l'exposition à la transmission du VIH
■ Oui
■ Non, mais des poursuites sont possibles en vertu des lois pénales générales.
■ Non
■ Données non disponibles

Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH
■ Oui
■ Non
■ Données non disponibles


Test VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes
■ Oui
■ Non
■ Données non disponibles

Remarque : Les données sur les lois limitant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH font actuellement l'objet d'un examen global qui impliquera une validation par les autorités de chaque pays. Une mise à jour est attendue d'ici la fin de 2018.

Sources : Engagement national et instrument de politique, 2017 et 2018 ; complétées par des sources supplémentaires, le cas échéant (voir les références en fin de chapitre).

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION


Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans refusant d'acheter de légumes chez un commerçant vivant avec le VIH en Afrique occidentale et centrale, 2000-2016



* Seules des femmes ont été interrogées.

Source : Enquêtes de population, 2000-2016.

Pourcentage de personnes vivant avec le VIH et victimes de discrimination dans les établissements de soins de santé, pays pour lesquels des données sont disponibles, Afrique occidentale et centrale, 2012-2015




■ Services de santé refusés en raison de leur statut VIH au moins une fois au cours des 12 derniers mois
■ Un professionnel de la santé a déjà informé d'autres personnes de leur statut VIH sans leur consentement

* Se sont vues refuser des soins de santé.

Source : Enquêtes sur l'indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, 2012-2015.


Pourcentage des populations-clés qui ont déclaré avoir évité les services de santé au cours des 12 derniers mois en raison de la stigmatisation et de la discrimination, pays pour lesquels des données sont disponibles, Afrique occidentale et centrale, 2014-2017



■ Travailleuses du sexe ■ Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

Source : Enquêtes intégrées de surveillance biologique et comportementale, 2014-2017.

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans ayant déjà été mariées ou en couple et ayant subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime au cours des 12 derniers mois, pays pour lesquels des données sont disponibles, Afrique occidentale et centrale, 2012-2017



Source : Enquêtes de population, 2012-2017.


Un taux élevé de stigmatisation et de conceptions erronées sur le VIH persistent dans la région.

Dans tous les pays disposant de données d'enquêtes de population récentes, à l'exception de deux, au moins 40 % des adultes ont déclaré qu'ils n'achèteraient pas de légumes chez un commerçant vivant avec le VIH. Au Congo et au Libéria, une part considérable des personnes vivant avec le VIH déclarent que des professionnels de la santé ont divulgué leur statut VIH à d'autres personnes sans leur consentement, une violation de la confidentialité qui mine la confiance dans les services liés au VIH. Des pourcentages relativement faibles de personnes vivant avec le VIH déclarent se voir refuser des services de soins de santé en raison de leur statut VIH, mais les populations-clés semblent faire face à des difficultés supplémentaires (1). En Côte d'Ivoire, par exemple, 23 % des travailleuses du sexe et 22 % des hommes homosexuels et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont déclaré éviter les services de soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination.

Les violences infligées par un partenaire intime sont courantes dans la région. Le pourcentage de femmes adultes (âgées de 15 à 49 ans) ayant déclaré avoir été agressées physiquement ou sexuellement par un partenaire intime au cours des 12 derniers mois s'élevait à 37 % en République démocratique du Congo et à 7 % en Gambie. Des efforts sont entrepris pour intégrer les droits des femmes et d'autres droits à la formation des agents de santé communautaires en République démocratique du Congo.

PRÉVENTION COMBINÉE DU VIH

Pourcentage de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ayant une connaissance correcte et complète du VIH, Afrique occidentale et centrale, 2012-2017



Source : Enquêtes de population, 2012-2017.


ENDA Santé, au Sénégal, renforce la capacité des organisations de travailleuses du sexe à promouvoir et à protéger les droits humains des travailleuses du sexe et à réduire la stigmatisation envers les hommes homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Les progrès lents dans la réduction des nouvelles infections par le VIH chez les adultes en Afrique occidentale et centrale mettent en évidence le besoin urgent d'étendre les efforts combinés de prévention du VIH dans la région.

Les connaissances sur le VIH et l'utilisation du préservatif sont faibles chez les jeunes de la région. Les enquêtes auprès de la population menées entre 2012 et 2017 (hommes et femmes âgés de 15 à 24 ans) indiquent que moins d'un jeune homme sur trois (29 %) et moins d'une jeune femme sur quatre (23 %) avaient des connaissances correctes et complètes sur la façon de prévenir le VIH.

L'utilisation du préservatif lors des derniers rapports sexuels avec un partenaire non régulier et non cohabitant variait d'un pays à l'autre, mais elle était souvent faible chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) : elle variait entre 6,8 % et 17,8 % chez les jeunes femmes et les jeunes hommes, respectivement au Sierra


Pourcentage de travailleurs du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec le dernier client et pourcentage d'hommes homosexuels et d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ayant déclaré avoir utilisé un préservatif avec le dernier partenaire masculin, pays pour lesquels des données sont disponibles, Afrique occidentale et centrale, 2014-2017



Source : 2018 Surveillance mondiale du sida.

DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DU VIH

Cascade du test et du traitement du VIH, Afrique occidentale et centrale, 2017



Source : Analyse spéciale de l'ONUSIDA, 2018 ; voir l'annexe sur les méthodes pour plus de détails.

Leone, à 65 % et 82,5 % chez les jeunes femmes et les jeunes hommes, respectivement, à Sao Tomé-et-Principe. L'utilisation du préservatif semble être plus élevée lors de rapports sexuels rémunérés (plus de 80 % dans 11 pays sur lesquels des données sont disponibles) et lors de rapports sexuels entre homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (plus de 70 % dans huit pays sur lesquels des données sont disponibles).


Parmi les 6,1 millions [4,4 à 8,1 millions] de personnes vivant avec le VIH en Afrique occidentale et centrale à la fin de 2017, 48 % [31 à 66 %] étaient au courant de leur statut sérologique, ce qui représente une augmentation de 43 % [27 à 59 %] en 2016. En 2017, l'écart pour atteindre la première des cibles 90–90–90 était de 2,6 millions de personnes vivant avec le VIH qui ne connaissaient pas leur statut sérologique.

Environ 2,4 millions [2,1 à 2,5 millions] de personnes dans la région avaient accès à une thérapie antirétrovirale en 2017, soit 40 % [25 à 55 %] de toutes les personnes vivant avec le VIH. En 2017, l'écart pour atteindre la deuxième des cibles 90–90–90 était de 2,5 millions de personnes vivant avec le VIH non traitées. Les points de distribution des antirétroviraux communautaires sont utilisés en République démocratique du Congo pour éviter les temps d'attente trop longs, la discrimination dans les dispensaires et les dépenses récurrentes. D'autres pays de la région reproduisent cette approche.

Le pourcentage estimé de personnes vivant avec le VIH dans la région qui ont obtenu une suppression virale est passé de 26 % [16 à 36 %] en 2016 à 29 % [19 à 40 %] en 2017. En 2017, l'écart pour atteindre la troisième des cibles 90–90–90 était la suppression virale chez 2,7 millions de personnes vivant avec le VIH supplémentaires.

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

Cascade de services de prévention de la transmission verticale et du débit de transmission, Afrique occidentale et centrale, 2017




Source : ONUSIDA 2018 ; Surveillance mondiale du sida 2018.

Sur les quelques 330 000 femmes enceintes vivant avec le VIH en 2017, moins de la moitié (48 %; [32–65 %]) ont reçu des services pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. En conséquence, le taux de transmission mère-enfant (y compris pendant la période d'allaitement) était de 20,2 %, soit le double de ce qu'il était en Afrique orientale et australe. Ce taux a peu évolué depuis 2014, ce qui laisse supposer que les efforts de la région pour éliminer la transmission verticale se sont ralentis. Le diagnostic précoce des nourrissons est également à la traîne, avec seulement 20 % environ des nourrissons exposés au VIH testés avant l'âge de huit semaines. Le faible dépistage du VIH et la faible couverture thérapeutique des enfants ont entraîné des taux de mortalité très élevés.

INVESTISSEMENT

Disponibilité des ressources sur le VIH par source, 2000-2017 et besoins en ressources prévisionnels d'ici à 2020, Afrique occidentale et centrale



* Estimations pour les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire selon la classification du niveau de revenu de la Banque mondiale pour 2015. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains constants de 2016.

Source : ONUSIDA 2018 estimations de la disponibilité des ressources et des besoins.

Les ressources disponibles pour la riposte au VIH en Afrique occidentale et centrale s'élevaient à environ 2,1 milliards d'USD en 2017, les ressources nationales représentant moins d'un tiers (31 %) du total. Un important déficit de financement s'est creusé dans cette région : environ 1,8 milliard d'USD sont nécessaires pour atteindre les objectifs accélérés, soit 81 % de plus que le financement disponible en 2017. Cependant, d'importantes priorités concurrentes (sécheresses, insécurité alimentaire, terrorisme et instabilité sociale) limitent les possibilités d'accroître les financements nationaux. Des arrangements dans lesquels les pays intensifient manifestement leur riposte au VIH sont nécessaires pour faire correspondre le financement national à un soutien externe accru.

Références

1. Enquêtes sur l'indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, 2012–2015.

Sources supplémentaires pour le tableau de bord des lois et politiques

- a. Sexual Rights Initiative [base de données]. Sexual Rights Initiative; c2016 (<http://sexualrightsdatabase.org/map/21/Adult%20sex%20work>).
- b. Rapport annuel de l'ILGA sur l'Homophobie d'État. Enquête mondiale sur les lois relatives à l'orientation sexuelle : criminalisation, protection et reconnaissance. ILGA ; 2017 (https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf).
- c. Bernard EJ, Cameron S. Advancing HIV justice 2. Building momentum in global advocacy against HIV criminalisation. Brighton and Amsterdam: HIV Justice Network, GNP+; 2016 (<https://www.scribd.com/doc/312008825/Advancing-HIV-Justice-2-Building-momentum-in-global-advocacy-against-HIV-criminalisation>).
- d. République du Bénin. Loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et des précurseurs. Article 9.
- e. République islamique de Mauritanie. Ordonnance 83-162 du 09 Juillet 1983 sur l'institution d'un Code Pénal. Article 308 (www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-1983-penal.pdf).
- f. République centrafricaine. Code pénal (promulgué en 2010). Dans : Journal officiel de la République centrafricaine; 2010 (<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/88116/100661/F1881819351/CAF-88116.pdf>).
- g. République du Tchad. Loi n°019/PR/2007 du 15 novembre 2007 sur la lutte contre le VIH / SIDA / IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH / SIDA. Articles 15 et 22 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126793.pdf).
- h. République de Côte d'Ivoire. Loi n°88-686 du 22 juillet 1988. Article 1 (<http://www.refworld.org/docid/3ae6b5860.html>).
- i. République de Gambie. Loi sur le contrôle des drogues (2003). Article 35 (<http://www.dleag-gambia.org/en/article/drug-laws>).
- j. Directives de politique nationale sur le VIH et le sida, 2014-2020 Banjul : Gouvernement de la République de Gambie, Conseil national sur le sida. (<http://www.moh.gov.gm/sites/default/files/Draft-HIV-Policy.pdf>).
- k. République islamique de Mauritanie. Loi n°2007.042 sur la prévention, la gestion et le contrôle du VIH / SIDA. Article 23 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127059.pdf).
- l. République du Togo. Code pénal. Article 262 (<http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104616/127692/F-194593081/TGO-104616.pdf>).
- m. Burkina Faso. Code pénal de 1996. Article 445 (https://elearning.trree.org/pluginfile.php/34806/mod_folder/content/0/04_Code_Penal.pdf?forcedownload=1).
- n. République du Burundi. Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 sur la révision du Code pénal. Article 567 (<https://www.assemblee.bi/IMG/pdf/code%20penal.pdf>).
- o. République fédérale du Nigéria. Loi sur l'Agence nationale de lutte antidrogue. Sec. 10. (<http://www.lawnigeria.com/LawsoftheFederation/NATIONAL-DRUG-LAW-ENFORCEMENT-AGENCY-ACT.html>).
- p. République du Sénégal. Code pénal. Article 319 (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181502).

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	4900 [2600–8400]	4300 [2200–7300]	4000 [2100–6800]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	1400 [<500–3100]	1200 [<500–2700]	660 [<500–1500]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	2200 [1100–3500]	1900 [990–3100]	2000 [1100–3300]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	1400 [750–2300]	1200 [650–2000]	1300 [710–2100]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,65 [0,33–1,11]	0,48 [0,25–0,83]	0,37 [0,19–0,63]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	4300 [2100–7500]	2600 [1300–4600]	2500 [1300–4500]
Décès liés au sida (0–14)	960 [<500–1900]	840 [<500–1700]	540 [<500–1100]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	1800 [900–3300]	870 [<500–1600]	1100 [520–1900]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	1500 [800–2500]	900 [<500–1500]	930 [510–1600]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	59 000 [39 000–84 000]	61 000 [41 000–87 000]	70 000 [46 000–99 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	6300 [3500–10 000]	7200 [3900–12 000]	6700 [3700–11 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	31 000 [21 000–44 000]	32 000 [22 000–46 000]	39 000 [26 000–55 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	22 000 [15 000–31 000]	21 000 [14 000–30 000]	24 000 [16 000–34 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Des lois pénalisant les actes sexuels entre personnes du même sexe ont été décriminalisées ou n'ont jamais existé
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	...
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 14 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2006	2012
	68,4	55,4

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2017	US\$ 1314	US\$ 6 423 375	US\$ 22 805 998


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-8%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-3%**



Rapport incidence/prévalence = **0,06**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	28 790	5 845	35	...	6 847
Prévalence du VIH	8,5%	4,2%	2,2%	...	0,6%
Connaissent leur statut VIH	59,2%	84,1%	71,2%	88,5%	...
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	83,5%	66%	51,8%	86,8%	...
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	950 [610-1400]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	55% [37-79%]	42% [28-60%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	27% [15-45%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	66% [45-94%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	45% [30-64%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ?

Non

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	17% [10-26%]	83% [48- >95%]
Diagnostic précoce du nourrisson	...% [...-...%]	32% [20-55%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2014)	
— Femmes	21,6%
— Hommes	31,3%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2012)	22,4%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	

— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection (2017)	94,6%
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	5000 [3400–6400]	4200 [2500–6000]	4300 [2600–6700]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	2500 [1600–3500]	1500 [770–2100]	660 [<500–1000]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	1300 [840–1900]	1500 [820–2300]	1900 [1100–3200]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	1100 [710–1600]	1200 [700–1900]	1700 [950–2800]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,38 [0,26–0,5]	0,28 [0,17–0,4]	0,23 [0,14–0,36]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	12 000 [9000–14 000]	5400 [3300–7500]	2900 [1900–4100]
Décès liés au sida (0–14)	2200 [1500–2800]	1000 [570–1500]	<500 [<500–710]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	4700 [3700–5700]	2200 [1200–3100]	870 [590–1300]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	4700 [3600–5700]	2200 [1300–3300]	1600 [950–2300]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	120 000 [90 000–150 000]	98 000 [75 000–120 000]	94 000 [72 000–120 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	19 000 [14 000–24 000]	15 000 [10 000–19 000]	9400 [6200–12 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	54 000 [40 000–68 000]	47 000 [36 000–57 000]	51 000 [38 000–64 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	46 000 [34 000–60 000]	37 000 [28 000–45 000]	34 000 [26 000–44 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Des lois pénalisant les actes sexuels entre personnes du même sexe ont été décriminalisées ou n'ont jamais existé
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	La possession de drogues à usage personnel est considérée comme un délit pénal
Criminalisation des personnes transgenres	...
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 18 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2013	US\$ 9 443 359	US\$ 7 780 061	...	US\$ 24 448 623	US\$ 16 729 035	US\$ 58 401 078


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **1%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-46%**



Rapport incidence/prévalence = **0,05**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	21 858	3 458	87	...	5 619
Prévalence du VIH	5,4%	1,9%	2,2%
Connaissent leur statut VIH	74,7%	67,9%
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	92,9%	87,2%
Couverture des programmes de prévention du VIH	46,8%	76,4%	...	46,8%	...
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	870 [550-1300]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	0,7%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	88% [67- >95%]	65% [49-82%]	49% [37-63%]
Enfants (0-14)	34% [23-44%]	28% [18-36%]	...%
Femmes (15+)	...%	83% [62- >95%]	...%
Hommes (15+)	70% [54-89%]	48% [37-62%]	...%

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes	...
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	47% [31-59%]	92% [63- >95%]
Diagnostic précoce du nourrisson	9% [7-14%]	16% [12-23%]

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	4100 [2700–5500]	3100 [1900–4300]	3100 [1800–4600]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	2100 [1400–2800]	1200 [610–1700]	690 [<500–1100]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	1200 [570–1900]	1100 [630–1800]	1400 [810–2100]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	770 [<500–1300]	740 [<500–1200]	920 [520–1400]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,57 [0,38–0,77]	0,37 [0,22–0,52]	0,29 [0,17–0,44]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	8600 [7600–9900]	5400 [3800–6600]	1700 [1200–2300]
Décès liés au sida (0–14)	1700 [1300–2100]	1000 [670–1300]	<500 [<500–630]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	3800 [3300–4300]	2400 [1700–3000]	580 [<500–750]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	3100 [2700–3700]	1900 [1300–2400]	680 [<500–920]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	100 000 [80 000–120 000]	82 000 [65 000–98 000]	78 000 [63 000–93 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	15 000 [12 000–18 000]	13 000 [9700–15 000]	8800 [6000–11 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	51 000 [39 000–61 000]	42 000 [32 000–50 000]	44 000 [35 000–52 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	35 000 [26 000–41 000]	27 000 [21 000–33 000]	26 000 [21 000–31 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Criminalisées et poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 16 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2016	20,3
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois	2014	2
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement	2014	2,6


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2017	27,9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2014	US\$ 2 098 404	US\$ 289 800	...	US\$ 15 903 384	US\$ 122 941	US\$ 18 414 529


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-2%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-69%**



Rapport incidence/prévalence = **0,04**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population
Prévalence du VIH	10,2%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	1500 [960-2200]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



	80% [64-94%]	77% [62-91%]	...% [...-...%]
Tous les âges			
Enfants (0-14)	42% [28-53%]	38% [26-48%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	90% [72- >95%]	88% [70- >95%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	75% [61-91%]	71% [58-87%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	51% [35-63%]	85% [61- >95%]
Diagnostic précoce du nourrisson	10% [8-15%]	20% [16-28%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2017)	40,3%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...

- Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection
- Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection
- Couverture du traitement de substitution des opioïdes
- Naloxone disponible (2016)
- Salles d'injection sûres disponibles (2016)

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	<200 [<200– <500]	<200 [<100– <200]	<200 [<100– <500]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	<100 [<100– <200]	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <200]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,38 [0,29–0,47]	0,23 [0,17–0,32]	0,24 [0,15–0,4]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	<200 [<200– <500]	<200 [<100– <200]	<100 [<100– <100]
Décès liés au sida (0–14)	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	<100 [<100– <200]	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]	<100 [<100– <100]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	2400 [1800–2800]	2300 [1900–2700]	2400 [2000–2900]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	<200 [<100– <200]	<200 [<100– <200]	<100 [<100– <200]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	1300 [1000–1600]	1300 [1100–1500]	1400 [1200–1700]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	900 [700–1100]	880 [720–1000]	950 [800–1100]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-
gation ou l'exposition à la transmission du VIH

Oui

Criminalisation du travail du sexe

L'achat et la vente de services
sexuels sont criminalisésCriminalisation des actes sexuels entre
personnes du même sexeDes lois pénalisant les actes
sexuels entre personnes du même
sexe ont été décriminalisées ou
n'ont jamais existéL'utilisation ou la possession de drogue pour
sa consommation personnelle est un délit

...

Criminalisation des personnes transgenres

...

Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la
résidence des personnes vivant avec le VIH

...

Consentement parental pour l'accès des
adolescents au dépistage du VIH

...

Consentement de l'époux à un accès aux
services SSR pour les femmes mariées

...

Dépistage VIH obligatoire pour les permis de
mariage, de travail ou de résidence ou pour
certains groupes

...

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes
âgés de 15–49 ans qui rapportent des
attitudes discriminatoires envers les
personnes vivant avec le VIH

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH
s'étant vues refuser l'accès à des services de
santé en raison de leur statut VIH au cours
des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH
ayant rapporté qu'un professionnel de santé
avait informé d'autres personnes de leur
statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées
ou en partenariat qui ont été victimes de
violence physique ou sexuelle de la part d'un
partenaire intime masculin au cours des 12
derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2014	US\$ 93 000	US\$ 2 343 480	US\$ 28 723	US\$ 1 076 920	US\$ 269 531	US\$ 3 811 654


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **11%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-53%**



Rapport incidence/prévalence = **0,05**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	1 445	694
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	73,8%	57,5%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	60 [38–87]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	75% [63–90%]	...% [...-...%]
Enfants (0–14)	...% [...-...%]	92% [64– >95%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	75% [62–89%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	74% [62–89%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	55% [37–71%]	>95% [>95– >95%]
Diagnostic précoce du nourrisson	>95% [87– >95%]	93% [74– >95%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15–24 ans	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes	...
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	...
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	46 000 [42 000–50 000]	34 000 [28 000–39 000]	28 000 [19 000–36 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	9 200 [7 400–11 000]	7 000 [4 500–9 000]	4 500 [2 600–6 300]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	24 000 [21 000–26 000]	17 000 [14 000–20 000]	15 000 [10 000–19 000]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	13 000 [12 000–16 000]	9 700 [8 000–12 000]	8 300 [5 700–11 000]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	2,86 [2,61–3,11]	1,84 [1,51–2,13]	1,24 [0,83–1,58]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	26 000 [22 000–30 000]	25 000 [22 000–28 000]	24 000 [20 000–28 000]
Décès liés au sida (0–14)	6 000 [4 900–6 900]	5 400 [3 900–6 400]	3 300 [2 000–4 500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	13 000 [10 000–15 000]	13 000 [11 000–15 000]	12 000 [9 500–14 000]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	7 600 [6 100–9 800]	6 600 [5 600–8 100]	9 000 [7 700–10 000]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	480 000 [440 000–510 000]	520 000 [460 000–570 000]	510 000 [430 000–600 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	36 000 [30 000–40 000]	43 000 [35 000–49 000]	40 000 [29 000–47 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	280 000 [260 000–300 000]	300 000 [270 000–340 000]	310 000 [260 000–360 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	160 000 [140 000–180 000]	170 000 [150 000–190 000]	160 000 [130 000–190 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-
gation ou l'exposition à la transmission du VIH ...

Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	La possession de drogues à usage personnel est considérée comme un délit pénal
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 14 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

	2006	2014
	43,9*	34,9

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement

VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


	2004
	26,1

*Personnes interrogées de sexe féminin uniquement


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2013	US\$ 13 745 789	US\$ 14 805 716	US\$ 12 252 577	US\$ 14 302 281	US\$ 17 442 940	US\$ 72 549 303


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-19%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-5%**




Rapport incidence/prévalence = **0,05**



POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	21 124	10 741	27 782
Prévalence du VIH	24,3%	3,96%
Connaissent leur statut VIH	...	67,3%
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	96%	77,9%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination	...	13,5%

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	71% [59–82%]	49% [41–57%]	...% [...–...%]
Enfants (0–14)	...% [...–...%]	25% [18–30%]	...% [...–...%]
Femmes (15+)	81% [69–94%]	56% [47–65%]	...% [...–...%]
Hommes (15+)	62% [51–74%]	43% [35–51%]	...% [...–...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Oui**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	42% [31–51%]	77% [60–93%]
Diagnostic précoce du nourrisson	20% [16–26%]	51% [42–66%]

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	16 000 [10 000–24 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15–24 ans (2014)	
— Femmes	32%
— Hommes	41,2%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2014)	21%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	

- Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection ...
- Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection ...
- Couverture du traitement de substitution des opioïdes ...
- Naloxone disponible (2016) ...
- Salles d'injection sûres disponibles (2016) ...

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	8700 [7600–11 000]	9500 [8000–11 000]	7700 [5900–10 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	2300 [1700–3000]	1600 [1200–2100]	1100 [780–1400]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	3700 [3000–4500]	4500 [3700–5500]	3800 [2900–5000]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	2700 [2200–3400]	3300 [2700–4200]	2800 [2100–3900]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	2,25 [1,94–2,72]	2,24 [1,87–2,73]	1,71 [1,3–2,31]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	15 000 [12 000–17 000]	9200 [7800–11 000]	5200 [4200–6600]
Décès liés au sida (0–14)	1900 [1400–2300]	1300 [910–1600]	700 [<500–940]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	7100 [5900–8200]	4500 [3800–5300]	2200 [1700–2800]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	5600 [4800–6700]	3400 [2900–4100]	2300 [1900–3000]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	160 000 [130 000–190 000]	130 000 [110 000–160 000]	110 000 [96 000–130 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	15 000 [12 000–18 000]	13 000 [9900–16 000]	8900 [6700–11 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	82 000 [70 000–99 000]	69 000 [58 000–82 000]	61 000 [52 000–72 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	60 000 [50 000–72 000]	50 000 [41 000–59 000]	43 000 [35 000–52 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Pas de législation spécifique
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 14 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Oui

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

Sources de financement	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2011	...	US\$ 1 892 102	...	US\$ 6 189 238	US\$ 764 633	US\$ 15 784 564


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-19%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-43%**



Rapport incidence/prévalence = **0,07**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	3 899	832
Prévalence du VIH	9,2%	6,1%	3,6%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	91,6%	48%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	6200 [3300-9900]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	53% [45-63%]	32% [27-38%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	38% [28-46%]	25% [19-30%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	66% [56-78%]	39% [34-46%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	39% [32-47%]	24% [20-29%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	34% [26-41%]	56% [44-69%]
Diagnostic précoce du nourrisson	1% [1-1%]	23% [19-29%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes	...
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	...
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	...
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	8500 [6900–10 000]	6300 [4800–7700]	5800 [3600–7700]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	2400 [1700–3100]	2000 [1300–2500]	1300 [780–1900]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	3600 [2900–4400]	2600 [1800–3200]	2700 [1500–3600]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	2400 [1900–3100]	1800 [1200–2200]	1800 [1100–2400]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,88 [0,72–1,07]	0,56 [0,42–0,67]	0,41 [0,26–0,54]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	7400 [5900–9200]	3700 [2700–4900]	3100 [1800–4300]
Décès liés au sida (0–14)	1600 [1100–1900]	1500 [1100–1900]	850 [<500–1100]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	3400 [2700–4300]	1200 [810–1700]	1100 [600–1700]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	2400 [1900–3200]	970 [650–1300]	1100 [670–1500]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	100 000 [82 000–120 000]	110 000 [86 000–130 000]	110 000 [94 000–140 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	12 000 [8300–15 000]	14 000 [10 000–16 000]	12 000 [8700–15 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	54 000 [43 000–65 000]	55 000 [45 000–67 000]	62 000 [52 000–74 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	36 000 [29 000–44 000]	37 000 [30 000–44 000]	40 000 [32 000–48 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	...
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Des lois pénalisant les actes sexuels entre personnes du même sexe ont été décriminalisées ou n'ont jamais existé
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	...
Criminalisation des personnes transgenres	...
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	...
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	...
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Oui

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2004	2015
	62,8	44,4

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2015
	17,5


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2013	US\$ 123 770	US\$ 4 622 591	...	US\$ 7 037 322	US\$ 2 509 164	US\$ 17 632 654


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-8%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-16%**



Rapport incidence/prévalence = **0,05**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	1 171
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	2800 [1800-4000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...%	45%	...%
Enfants (0-14)	...%	18%	...%
Femmes (15+)	...%	55%	...%
Hommes (15+)	...%	39%	...%

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2014)	
— Femmes	11,2%
— Hommes	15,4%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant) (2015)	
— Femmes	31,6%
— Hommes	39,7%
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2015)	20,2%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis (2015)	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	...
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	21% [15-26%]	68% [52-83%]
Diagnostic précoce du nourrisson	3% [3-4%]	5% [4-6%]

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	6500 [5000–7500]	7200 [6000–8300]	7900 [6800–9100]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	1500 [1000–1900]	1600 [1100–2000]	1700 [1200–2200]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	3300 [2500–3900]	3800 [3200–4300]	4100 [3500–4800]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	1700 [1300–2100]	1900 [1600–2300]	2100 [1800–2600]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	1,84 [1,42–2,13]	1,75 [1,45–2]	1,59 [1,36–1,84]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	6600 [5700–7400]	4600 [3700–5500]	4900 [3900–5800]
Décès liés au sida (0–14)	1100 [770–1400]	1000 [640–1400]	1200 [770–1500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	3400 [2900–3800]	2400 [2000–2800]	2300 [1800–2800]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	2000 [1800–2300]	1100 [870–1400]	1400 [1200–1700]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	77 000 [64 000–90 000]	84 000 [68 000–98 000]	100 000 [85 000–110 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	8000 [5300–10 000]	8100 [5500–10 000]	9100 [6400–11 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	46 000 [38 000–54 000]	51 000 [41 000–59 000]	61 000 [52 000–70 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	23 000 [19 000–27 000]	26 000 [21 000–30 000]	30 000 [25 000–34 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	...
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Des lois pénalisant les actes sexuels entre personnes du même sexe ont été décriminalisées ou n'ont jamais existé
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	...
Criminalisation des personnes transgenres	...
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	...
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	...
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	...

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2005	2012
	44,9	35,4
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois	2015	
		6,1
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement	2015	
		17,9


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2010	...	US\$ 8 104 228	...	US\$ 6 354 280	US\$ 1 676 938	US\$ 16 472 586


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **10%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **7%**




Rapport incidence/prévalence = **0,08**



POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	9 665	1 271	411
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	...	52,3%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	32% [28–37%]	29% [25–33%]	...% [...–...%]
Enfants (0–14)	19% [14–24%]	18% [13–23%]	...% [...–...%]
Femmes (15+)	32% [27–37%]	31% [26–35%]	...% [...–...%]
Hommes (15+)	37% [31–42%]	29% [24–33%]	...% [...–...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	11% [8–14%]	11% [8–14%]
Diagnostic précoce du nourrisson	7% [5–10%]	3% [3–5%]

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	5100 [2600–8400]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15–24 ans (2015)	
— Femmes	26,7%
— Hommes	45,3%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2012)	38%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...

Réduction des risques

— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	...
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	28 000 [12 000–52 000]	29 000 [13 000–54 000]	30 000 [13 000–56 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	9 700 [3 700–19 000]	6 800 [2 600–13 000]	3 800 [1 500–7 500]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	9 200 [4 000–17 000]	11 000 [4 900–21 000]	13 000 [5 800–25 000]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	8 900 [3 900–17 000]	11 000 [4 800–20 000]	13 000 [5 600–24 000]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	1,61 [0,69–3,04]	1,52 [0,65–2,86]	1,29 [0,55–2,43]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	55 000 [33 000–83 000]	35 000 [21 000–53 000]	24 000 [15 000–37 000]
Décès liés au sida (0–14)	7 600 [4 200–12 000]	5 500 [3 000–8 800]	3 100 [1 700–4 900]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	24 000 [14 000–37 000]	15 000 [8 700–24 000]	8 700 [5 000–14 000]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	24 000 [15 000–35 000]	14 000 [8 800–21 000]	13 000 [7 700–18 000]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	630 000 [440 000–870 000]	520 000 [370 000–720 000]	500 000 [350 000–690 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	57 000 [35 000–80 000]	50 000 [31 000–70 000]	38 000 [24 000–54 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	310 000 [220 000–430 000]	260 000 [180 000–360 000]	270 000 [190 000–370 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	260 000 [170 000–370 000]	210 000 [140 000–300 000]	190 000 [130 000–270 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Autre réglementation punitive du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Pas de législation spécifique
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	La possession de drogues à usage personnel est considérée comme un délit pénal
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 16 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2005	2012
	50	44,5
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois		2016
		2,4
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement		2016
		3,4


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2012
	22


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2013	US\$ 807 455	US\$ 13 736 337	US\$ 78 857 391	US\$ 5 994 103	US\$ 4 460 230	US\$ 103 855 116


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **3%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-30%**



Rapport incidence/prévalence = **0,06**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	9 211	29 549	120	...	17 823
Prévalence du VIH	12,2%	12,33%	5,3%	...	1,2%
Connaissent leur statut VIH	...	13,3%	22,8%
Couverture traitement antirétroviral	24%	11,1%	96,8%
Utilisation du préservatif	93,8%	75,05%	50,4%
Couverture des programmes de prévention du VIH	96,2%	18,4%	...	96,2%	...
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination	23,3%	15,8%

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	7900 [5000 -11 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	4,9%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH (données d'enquête) (2012)	10%
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



	54% [38-75%]	46% [32-63%]	35% [25-49%]
Tous les âges	...	27%	21%
Enfants (0-14)	...	60%	46%
Femmes (15+)	42%	29%	23%
Hommes (15+)	[28-60%]	[20-42%]	[15-32%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	41% [26-60%]	70% [45- >95%]
Diagnostic précoce du nourrisson	22% [15-34%]	40% [27-62%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2015)	
— Femmes	24%
— Hommes	33%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitants) (2016)	
— Femmes	30,4%
— Hommes	41,8%
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2016)	33,7%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	

— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection (2016)	0%
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	39 000 [32 000–46 000]	23 000 [17 000–30 000]	15 000 [8200–23 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	13 000 [9800–16 000]	9800 [6800–12 000]	4800 [2500–7100]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	19 000 [15 000–23 000]	9900 [6600–13 000]	7600 [3800–12 000]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	6400 [5200–8400]	3400 [2300–4700]	2600 [1300–4200]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,66 [0,54–0,79]	0,33 [0,24–0,44]	0,17 [0,09–0,27]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	46 000 [41 000–51 000]	40 000 [33 000–45 000]	17 000 [9600–25 000]
Décès liés au sida (0–14)	9600 [7300–11 000]	8000 [5900–9600]	3400 [2000–4800]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	26 000 [22 000–29 000]	23 000 [20 000–26 000]	11 000 [5400–15 000]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	11 000 [9600–13 000]	8300 [6800–9700]	3400 [2000–5000]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	580 000 [480 000–650 000]	490 000 [380 000–580 000]	390 000 [310 000–470 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	72 000 [57 000–81 000]	70 000 [54 000–80 000]	51 000 [35 000–63 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	370 000 [300 000–420 000]	300 000 [230 000–370 000]	250 000 [190 000–300 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	140 000 [110 000–160 000]	110 000 [86 000–140 000]	95 000 [76 000–110 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Criminalisation partielle du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Des lois pénalisant les actes sexuels entre personnes du même sexe ont été décriminalisées ou n'ont jamais existé
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	...
Criminalisation des personnes transgenres	...
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 18 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	...
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	...

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2007	2014
	53,9	49,2
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois	2012	
		6,1
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement	2012	
		9,9


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2007	2014
	59,3	36,8


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2014	US\$ 97 139 495	US\$ 97 139 495


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-35%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-56%**



Rapport incidence/prévalence = **0,04**



POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	55 905	30 764	3 451
Prévalence du VIH	...	3,3%	5,9%	7,9%	1%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	...	77,4%	60%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016) ...


Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016) ...

Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH ...

Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné ...

Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C ...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	59% [46–71%]	55% [43–66%]	...% [...–...%]
Enfants (0–14)	...% [...–...%]	34% [24–42%]	...% [...–...%]
Femmes (15+)	62% [49–75%]	55% [43–66%]	...% [...–...%]
Hommes (15+)	...% [...–...%]	64% [51–75%]	...% [...–...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	7% [5–9%]	59% [44–74%]
Diagnostic précoce du nourrisson	3% [2–4%]	34% [27–46%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15–24 ans (2014)

Femmes	18,6%
Hommes	24,9%

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant) (2014)

Femmes	22,6%
Hommes	30,7%

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2014) 19,5%

Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis Sans objet

Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales Sans objet

Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017) ...

Réduction des risques

Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection (2015)	22%
Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection (2015)	0,7
Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
Naloxone disponible (2016)	...
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	2800 [2300–3400]	3700 [3000–4600]	4100 [2800–6400]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	<500 [<500– <500]	530 [<500–650]	540 [<500–770]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	1300 [1100–1600]	1600 [1300–2000]	1700 [1200–2700]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	1100 [920–1400]	1600 [1300–2000]	1800 [1200–2900]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	3,85 [3,17–4,74]	4,14 [3,38–5,11]	3,45 [2,37–5,46]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	1100 [820–1500]	1500 [1100–1900]	1900 [1500–2500]
Décès liés au sida (0–14)	<500 [<200– <500]	<500 [<500– <500]	<500 [<500– <500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	<500 [<500–660]	650 [<500–850]	<500 [<500–590]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	<500 [<500–630]	520 [<500–700]	1200 [950–1500]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	21 000 [17 000–26 000]	34 000 [29 000–39 000]	53 000 [44 000–68 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	1500 [1100–1900]	2300 [1800–2800]	3400 [2400–4100]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	10 000 [8500–13 000]	16 000 [14 000–19 000]	26 000 [22 000–32 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	9300 [7600–11 000]	15 000 [13 000–18 000]	24 000 [20 000–32 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Le travail du sexe n'est pas soumis à des réglementations punitives ou n'est pas criminalisé
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Pas de législation spécifique
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 16 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2013	US\$ 260 066	US\$ 7 844 051	US\$ 132 193	US\$ 8 715 789


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **10%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **33%**



Rapport incidence/prévalence = **0,08**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	5 791
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	1100 [930-1300]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	38% [32-49%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	17% [12-21%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	59% [50-74%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	20% [16-27%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Oui**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	17% [13-20%]	64% [49-82%]
Diagnostic précoce du nourrisson	...% [...-...%]	...% [...-...%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes	...
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	3100 [2800–3500]	3200 [2800–3700]	3100 [2600–3700]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	<500 [<500–580]	<500 [<500–620]	<500 [<500–570]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	1900 [1600–2100]	1900 [1700–2200]	1900 [1500–2200]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	740 [640–890]	810 [680–970]	800 [660–1000]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	2,29 [2,04–2,59]	2,06 [1,81–2,36]	1,6 [1,35–1,9]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	1500 [1200–1800]	1600 [1300–1900]	1300 [960–1700]
Décès liés au sida (0–14)	<500 [<500– <500]	<500 [<500– <500]	<200 [<200– <500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	850 [650–1100]	970 [770–1200]	690 [510–930]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	<500 [<500– <500]	<500 [<200– <500]	<500 [<500–520]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	32 000 [28 000–36 000]	42 000 [37 000–48 000]	56 000 [49 000–65 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	1800 [1500–2100]	2300 [1800–2700]	2900 [2100–3500]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	21 000 [19 000–24 000]	28 000 [24 000–32 000]	37 000 [33 000–43 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	8600 [7500–10 000]	12 000 [11 000–14 000]	16 000 [14 000–18 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Non, mais des poursuites sont possibles en vertu des lois pénales générales
Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Aucune peine particulière
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 14 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Oui

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2012 25,3
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois	2013 13,7
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement	


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2012 31,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2014	US\$ 1 190 251	US\$ 4 808 085	US\$ 454 441	US\$ 6 452 777


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-4%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-19%**



Rapport incidence/prévalence = **0,06**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	368
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	2000 [1400 -2800]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	5,6%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné (2017)	100%
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	77% [67-88%]	59% [52-67%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	50% [36-60%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	79% [71-91%]	57% [51-65%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	76% [66-85%]	65% [57-73%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	29% [21-34%]	64% [50-74%]
Diagnostic précoce du nourrisson	6% [5-8%]	4% [3-5%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2012)	44%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	2200 [1800–2600]	1600 [1300–2000]	1400 [980–1800]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	<500 [<500– <500]	<500 [<200– <500]	<500 [<200– <500]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	1000 [810–1300]	770 [590–950]	640 [<500–840]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	840 [650–1000]	630 [<500–800]	520 [<500–710]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	1,57 [1,26–1,92]	1,01 [0,77–1,26]	0,68 [0,48–0,9]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	900 [690–1200]	1200 [900–1500]	1100 [770–1400]
Décès liés au sida (0–14)	<200 [<200– <500]	<200 [<200– <200]	<200 [<100– <200]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	<500 [<500– <500]	540 [<500–690]	<500 [<500–540]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	<500 [<500– <500]	<500 [<500–640]	520 [<500–660]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	17 000 [14 000–20 000]	20 000 [16 000–23 000]	21 000 [17 000–25 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	970 [800–1200]	1400 [1100–1600]	1700 [1300–2000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	8800 [7300–11 000]	10 000 [8400–12 000]	11 000 [9200–14 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	7000 [5800–8600]	8000 [6400–9700]	7900 [6200–9600]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Criminalisation partielle du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	...
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 18 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	...
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2013 51
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois	
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement	


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2013 7,3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2014	...	US\$ 3 850 001	US\$ 3 850 001


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-16%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-9%**




Rapport incidence/prévalence = **0,07**



POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	3 100	150
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	...	45,5%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	32% [26-38%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	29% [23-35%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	43% [35-52%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	18% [14-21%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	55% [44-67%]	65% [55-77%]
Diagnostic précoce du nourrisson	...% [...-...%]	12% [10-14%]

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	650 [490-840]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans	
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2013)	26,7%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	...
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	26 000 [22 000–29 000]	21 000 [17 000–24 000]	19 000 [15 000–24 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	5 900 [4 600–7 100]	4 900 [3 400–6 400]	3 400 [2 000–4 700]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	13 000 [11 000–15 000]	10 000 [8 500–12 000]	10 000 [7 900–13 000]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	7 100 [6 000–8 700]	5 300 [4 300–6 400]	5 400 [4 100–7 000]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	1,25 [1,07–1,42]	0,87 [0,72–1,03]	0,68 [0,54–0,86]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	23 000 [20 000–27 000]	21 000 [18 000–24 000]	16 000 [12 000–19 000]
Décès liés au sida (0–14)	4 100 [3 400–4 700]	3 600 [2 700–4 500]	2 900 [1 900–3 700]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	10 000 [8 300–12 000]	10 000 [8 800–12 000]	6 600 [4 800–8 300]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	8 900 [7 700–11 000]	6 800 [5 900–8 300]	6 200 [5 000–7 500]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	310 000 [270 000–360 000]	310 000 [260 000–360 000]	310 000 [260 000–370 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	28 000 [24 000–31 000]	31 000 [25 000–36 000]	28 000 [21 000–34 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	170 000 [150 000–200 000]	180 000 [150 000–210 000]	190 000 [160 000–220 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	120 000 [97 000–140 000]	100 000 [84 000–120 000]	95 000 [78 000–110 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (14 ans - à vie)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	La possession de drogues à usage personnel est considérée comme un délit pénal
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 18 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2003	2014
	69	67,7
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois		2014
		1,4
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement		2014
		7,9


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2015	US\$ 42 472 953	US\$ 4 679 195	US\$ 14 869 957	US\$ 30 239 646	US\$ 44 973	US\$ 92 306 722


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-8%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-24%**



Rapport incidence/prévalence = **0,06**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	...	30 579
Prévalence du VIH	6,9%	2,3%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral	100%
Utilisation du préservatif	89,9%	60%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	10 000 [4700 -17 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...%	40%	...%
Enfants (0-14)	...%	23%	...%
Femmes (15+)	...%	48%	...%
Hommes (15+)	...%	30%	...%

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	32% [23-39%]	66% [49-79%]
Diagnostic précoce du nourrisson	1% [1-1%]	30% [25-41%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2014)	
— Femmes	19,9%
— Hommes	27,2%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant) (2014)	
— Femmes	17,1%
— Hommes	39,1%
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2014)	41,2%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis (2014)	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	

- Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection
- Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection
- Couverture du traitement de substitution des opioïdes
- Naloxone disponible (2016)
- Salles d'injection sûres disponibles (2016)

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	9200 [7700–11 000]	8500 [6900–10 000]	8100 [5700–11 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	1800 [1400–2200]	1700 [1300–2100]	1500 [1000–2000]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	4300 [3500–5100]	3900 [3100–4800]	3800 [2600–5000]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	3100 [2500–3800]	2900 [2300–3700]	2800 [1900–3900]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,97 [0,82–1,14]	0,81 [0,65–0,99]	0,66 [0,46–0,86]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	6700 [5200–8000]	4800 [3800–5600]	5100 [3900–6300]
Décès liés au sida (0–14)	1200 [940–1500]	1200 [860–1400]	720 [<500–1000]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	3100 [2400–3800]	2100 [1600–2500]	2100 [1600–2700]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	2400 [1800–2900]	1500 [1200–1900]	2300 [1800–2800]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	93 000 [78 000–110 000]	100 000 [87 000–120 000]	120 000 [97 000–140 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	8600 [6200–11 000]	9300 [7100–11 000]	10 000 [7700–12 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	50 000 [42 000–59 000]	55 000 [47 000–65 000]	66 000 [54 000–80 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	34 000 [29 000–41 000]	38 000 [32 000–45 000]	42 000 [34 000–52 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Le travail du sexe n'est pas soumis à des réglementations punitives ou n'est pas criminalisé
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 18 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2005	2012
	84,9	80,1

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2012
	23,2


DÉPENSES

Sources de financement	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2017	US\$ 23 596	US\$ 689 891	...	US\$ 7 640 110	...	US\$ 8 873 515


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-5%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **7%**



Rapport incidence/prévalence = **0,07**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	14 248	766	1 793
Prévalence du VIH	10,7%	11,4%	5,5%	...	2,3%
Connaissent leur statut VIH	...	93%	11%
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	93,5%	65,5%	49,1%
Couverture des programmes de prévention du VIH	...	17,1%
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination	1,5%

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	5400 [3400-7800]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	35% [29-43%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	18% [14-22%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	38% [31-46%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	37% [29-45%]	35% [28-43%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	18% [14-22%]	38% [29-47%]
Diagnostic précoce du nourrisson	5% [4-6%]	11% [9-15%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2016)	15,2%
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2012)	24,6%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	4200 [3700–4800]	3200 [2700–3700]	2300 [1700–2900]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	760 [560–930]	780 [550–950]	510 [<500–670]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	2000 [1700–2400]	1400 [1100–1700]	1100 [740–1300]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	1400 [1200–1800]	1000 [800–1200]	760 [520–990]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	3,17 [2,77–3,65]	2,16 [1,8–2,5]	1,31 [0,95–1,63]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	1600 [1300–2000]	2000 [1600–2400]	1900 [1600–2200]
Décès liés au sida (0–14)	<500 [<500– <500]	<500 [<500–570]	<500 [<500– <500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	690 [500–920]	870 [680–1100]	740 [600–910]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	530 [<500–750]	630 [<500–860]	790 [650–930]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	30 000 [26 000–34 000]	37 000 [33 000–41 000]	40 000 [32 000–45 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	2700 [2000–3400]	3900 [2900–4700]	4200 [2900–5000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	16 000 [14 000–18 000]	20 000 [18 000–22 000]	22 000 [18 000–24 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	11 000 [10 000–13 000]	14 000 [12 000–15 000]	14 000 [11 000–16 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	...
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	...
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	...
Criminalisation des personnes transgenres	...
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	...
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	...
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	...

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2006	2014
	48*	63

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement

VIOLENCE


Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois

*Personnes interrogées de sexe féminin uniquement


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2010	...	US\$ 611 774	US\$ 3 959 113	US\$ 5 258 837


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-27%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-5%**



Rapport incidence/prévalence = **0,06**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	3 138	7 048
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	2200 [1400 -3200]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	...
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	30% [24-34%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	16% [11-19%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	39% [32-44%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	20% [16-23%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2014)	
— Femmes	22,5%
— Hommes	21,7%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes	...
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	...
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	15% [11-19%]	65% [46-79%]
Diagnostic précoce du nourrisson	...% [...-...%]	36% [29-51%]

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	2700 [1900–3500]	2500 [1900–3100]	2300 [1700–3200]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	870 [630–1100]	570 [<500–750]	<500 [<200– <500]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	1000 [730–1400]	1200 [870–1500]	1200 [870–1700]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	740 [510–1000]	820 [610–1000]	870 [620–1200]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,86 [0,63–1,12]	0,68 [0,51–0,84]	0,51 [0,36–0,71]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	5200 [4300–6000]	3800 [3100–4600]	2500 [2000–3000]
Décès liés au sida (0–14)	730 [590–880]	<500 [<500–630]	<500 [<200– <500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	2600 [2100–3000]	2000 [1600–2300]	1200 [920–1500]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	1900 [1500–2200]	1300 [1000–1600]	1000 [850–1300]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	53 000 [43 000–63 000]	45 000 [36 000–55 000]	40 000 [32 000–50 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	6000 [4300–7400]	5000 [4000–6100]	3300 [2500–4300]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	28 000 [23 000–34 000]	24 000 [19 000–30 000]	22 000 [18 000–28 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	19 000 [14 000–23 000]	16 000 [12 000–19 000]	14 000 [11 000–18 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	L'achat et la vente de services sexuels sont criminalisés
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	La possession de drogues à usage personnel est considérée comme un délit pénal
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 14 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2007	2013
	51,5	52,7
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois		2013
		2,5
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement		2013
		15,7


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2011	...	US\$ 190 000	...	US\$ 22 804 922	...	US\$ 31 123 572


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-8%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-34%**



Rapport incidence/prévalence = **0,06**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	1 077
Prévalence du VIH
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	...	19,5%	44,3%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	2200 [1400-3200]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	26,9%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	29% [23-36%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	18% [14-23%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	39% [31-48%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	16% [12-20%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ?	Non
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	...
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2013)	41,5%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	...
— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	27% [20-35%]	86% [65->95%]
Diagnostic précoce du nourrisson	5% [4-7%]	...% [...-...%]

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	9500 [7700–11 000]	9300 [7400–11 000]	9900 [7200–12 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	2000 [1700–2500]	1900 [1400–2300]	2000 [1600–2500]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	4300 [3500–5300]	4300 [3400–5300]	4500 [3300–5800]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	3100 [2400–3800]	3100 [2400–3900]	3300 [2300–4100]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,77 [0,63–0,93]	0,64 [0,51–0,78]	0,55 [0,41–0,69]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	6400 [5500–7500]	5000 [4000–6200]	6300 [4900–7900]
Décès liés au sida (0–14)	1300 [1100–1600]	1100 [880–1400]	980 [760–1300]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	2900 [2400–3400]	2200 [1700–2800]	2900 [2200–3700]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	2200 [1800–2700]	1700 [1300–2100]	2400 [1900–3000]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	100 000 [85 000–120 000]	110 000 [96 000–140 000]	130 000 [110 000–160 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	9600 [8200–11 000]	11 000 [9500–13 000]	13 000 [11 000–16 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	54 000 [46 000–65 000]	62 000 [52 000–76 000]	72 000 [60 000–87 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	37 000 [30 000–44 000]	42 000 [34 000–50 000]	45 000 [36 000–54 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Le travail du sexe n'est pas soumis à des réglementations punitives ou n'est pas criminalisé
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Pas de législation spécifique
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	...
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Non
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

	2006	2013
Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	68,5	45,8

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

	2006	2013
Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	21,5	26,9


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2012	US\$ 207 918	US\$ 6 136 480	US\$ 388 726	US\$ 9 560 778	US\$ 3 380 622	US\$ 21 794 990


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **6%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **26%**



Rapport incidence/prévalence = **0,08**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	35 903	3 671	749	...	5 354
Prévalence du VIH	...	13,7%	5,1%	...	1,4%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	...	76,9%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	1400 [900-2000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	6,3%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	...% [...-...%]	32% [26-38%]	13% [11-16%]
Enfants (0-14)	...% [...-...%]	23% [19-27%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	...% [...-...%]	37% [31-45%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	27% [21-32%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Oui**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	35% [28-41%]	31% [26-37%]
Diagnostic précoce du nourrisson	8% [7-9%]	11% [9-13%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2015)	
— Femmes	20,4%
— Hommes	28,7%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2013)	28,7%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	

- Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection ...
- Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection ...
- Couverture du traitement de substitution des opioïdes ...
- Naloxone disponible (2016) Non
- Salles d'injection sûres disponibles (2016) Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	1100 [830–1400]	<500 [<500–690]	<500 [<200–510]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	<200 [<200– <200]	<200 [<100– <200]	<100 [<100– <200]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	<500 [<200– <500]	<100 [<100– <200]	<100 [<100– <200]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	670 [500–850]	<500 [<200– <500]	<200 [<100– <500]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,36 [0,27–0,45]	0,12 [0,07–0,2]	0,06 [0,03–0,12]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	890 [690–1200]	850 [680–1000]	700 [<500–980]
Décès liés au sida (0–14)	<100 [<100– <200]	<100 [<100– <200]	<100 [<100– <100]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	<500 [<200– <500]	<200 [<200– <500]	<200 [<200– <500]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	580 [<500–770]	600 [<500–730]	<500 [<500–650]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	15 000 [12 000–17 000]	13 000 [10 000–16 000]	9000 [6400–13 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	600 [<500–720]	700 [590–810]	650 [530–790]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	4100 [3400–4800]	3900 [3100–4800]	3000 [2200–4100]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	9800 [8000–11 000]	8300 [6400–10 000]	5400 [3600–8100]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	...
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, peine capitale
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	...
Criminalisation des personnes transgenres	...
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	...
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	...
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	...
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	...

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2007	2015
	69,8	69,7

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

Sources de financement	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2013	US\$ 1 915 820	...	US\$ 2 731 148


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-37%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-18%**



Rapport incidence/prévalence = **0,03**



Nombre de personnes


POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	315	160	488
Prévalence du VIH	4%	44,4%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	220 [84-420]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	3,7%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	33% [24-48%]	33% [24-48%]	22% [16-31%]
Enfants (0-14)	27% [22-32%]	25% [21-31%]	12% [10-14%]
Femmes (15+)	52% [39-72%]	52% [39-72%]	35% [26-48%]
Hommes (15+)	...% [...-...%]	24% [16-36%]	16% [10-24%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2015)	
— Femmes	8,3%
— Hommes	8,9%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes	...
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...

Réduction des risques

— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
— Naloxone disponible (2016)	...
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	...

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	8% [6-10%]	12% [9-15%]
Diagnostic précoce du nourrisson	...% [...-...%]	8% [7-11%]

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	3000 [2300–3600]	1600 [1200–2100]	1700 [1200–2200]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	740 [610–910]	<500 [<500– <500]	540 [<500–680]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	830 [650–1000]	630 [<500–830]	630 [<500–870]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	1400 [1000–1800]	680 [<500–930]	520 [<500–740]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,23 [0,18–0,27]	0,1 [0,08–0,13]	0,08 [0,06–0,11]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	3000 [2400–3800]	2100 [1600–2500]	1800 [1400–2300]
Décès liés au sida (0–14)	<500 [<500–590]	<500 [<500– <500]	<500 [<200– <500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	960 [750–1200]	520 [<500–680]	<500 [<500–590]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	1500 [1200–2000]	1200 [960–1500]	1100 [870–1300]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	41 000 [35 000–47 000]	38 000 [33 000–43 000]	36 000 [31 000–41 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	3200 [2700–3800]	3400 [2800–3900]	3300 [2700–3800]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	16 000 [14 000–18 000]	15 000 [13 000–17 000]	16 000 [14 000–18 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	22 000 [19 000–26 000]	20 000 [17 000–23 000]	16 000 [14 000–19 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Autre réglementation punitive du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Pas de législation spécifique
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 16 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2006	2012
	79	71,5

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

Sources de financement	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2017	...	US\$ 245 636	US\$ 155 413	US\$ 18 825 476	...	US\$ 32 216 586


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **4%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-14%**



Rapport incidence/prévalence = **0,05**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	47 645	12 310	670	...	17 064
Prévalence du VIH	17%	17,6%	1,9%
Connaissent leur statut VIH	54,2%	52,4%
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	88%	78,9%
Couverture des programmes de prévention du VIH	59,1%	46,4%	...	59,1%	...
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	950 [600-1400]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	8%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	55% [47-63%]	52% [45-59%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	39% [33-46%]	39% [33-46%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	71% [61-81%]	66% [57-75%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	42% [36-48%]	39% [33-46%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ?

Non

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	93% [79- >95%]	40% [34-47%]
Diagnostic précoce du nourrisson	...% [...-...%]	10% [9-12%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2016)	
— Femmes	15,8%
— Hommes	25,5%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2012)	40,9%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	

- Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection
- Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection
- Couverture du traitement de substitution des opioïdes
- Naloxone disponible (2016)
- Salles d'injection sûres disponibles (2016)

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	250 000 [140 000–390 000]	220 000 [120 000–340 000]	210 000 [110 000–320 000]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	43 000 [22 000–69 000]	38 000 [20 000–62 000]	36 000 [19 000–58 000]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	110 000 [59 000–170 000]	91 000 [50 000–140 000]	86 000 [47 000–130 000]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	99 000 [54 000–160 000]	87 000 [48 000–140 000]	85 000 [46 000–140 000]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	1,88 [1,03–2,99]	1,44 [0,79–2,3]	1,15 [0,63–1,84]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	180 000 [110 000–290 000]	180 000 [110 000–290 000]	150 000 [86 000–230 000]
Décès liés au sida (0–14)	28 000 [14 000–47 000]	27 000 [13 000–45 000]	23 000 [11 000–38 000]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	75 000 [41 000–120 000]	75 000 [42 000–120 000]	53 000 [29 000–85 000]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	80 000 [48 000–120 000]	81 000 [48 000–130 000]	73 000 [44 000–110 000]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	2 900 000 [1 900 000–4 100 000]	3 000 000 [2 000 000–4 200 000]	3 100 000 [2 100 000–4 400 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	180 000 [100 000–270 000]	210 000 [120 000–310 000]	220 000 [120 000–330 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	1 400 000 [940 000–1 900 000]	1 400 000 [970 000–2 000 000]	1 600 000 [1 100 000–2 200 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	1 300 000 [860 000–1 900 000]	1 300 000 [850 000–1 900 000]	1 300 000 [860 000–1 900 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Non, mais des poursuites sont possibles en vertu des lois pénales générales
Criminalisation du travail du sexe	Autre réglementation punitive du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	La possession de drogues à usage personnel est considérée comme un délit pénal
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 18 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2003	2013
	62,3	46,8

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2008	2013
	14,7	11


DÉPENSES

Sources de financement	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2016	...	US\$ 57 728 627	US\$ 409 117 056	US\$ 46 050 460	...	US\$ 512 896 142


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-5%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-19%**



Rapport incidence/prévalence = **0,07**



Nombre de personnes


POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	103 506	26 014	44 515
Prévalence du VIH	14,4%	23%	3,4%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	98,1%	51%	83,2%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	63 000 [40 000 -93 000]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	6,8%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	38% [26-54%]	33% [22-47%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	25% [14-37%]	26% [15-39%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	49% [33-68%]	44% [30-61%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	29% [18-42%]	22% [14-32%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Oui**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	17% [10-24%]	30% [19-44%]
Diagnostic précoce du nourrisson	6% [4-10%]	12% [8-19%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2017)	
— Femmes	29,3%
— Hommes	27,9%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant)	
— Femmes	...
— Hommes	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2013)	38,8%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	364
Réduction des risques	

- Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection
- Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection
- Couverture du traitement de substitution des opioïdes
- Naloxone disponible (2016)
- Salles d'injection sûres disponibles (2016)

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	4400 [3600–5400]	2200 [1600–2800]	1600 [900–2300]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	920 [760–1100]	800 [660–990]	<500 [<500–600]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	2200 [1700–2700]	870 [590–1100]	670 [<500–1100]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	1300 [1100–1700]	540 [<500–720]	<500 [<500–650]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	0,41 [0,33–0,5]	0,18 [0,13–0,22]	0,1 [0,06–0,15]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	3000 [2300–3800]	1900 [1400–2500]	2100 [1500–2800]
Décès liés au sida (0–14)	600 [500–710]	560 [<500–670]	<500 [<500–500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	1400 [1100–1900]	650 [<500–900]	970 [690–1400]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	930 [710–1200]	660 [<500–880]	740 [540–960]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	47 000 [40 000–55 000]	49 000 [43 000–57 000]	43 000 [36 000–51 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	4400 [3600–5200]	5500 [4700–6500]	5000 [4200–6000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	27 000 [23 000–32 000]	28 000 [25 000–33 000]	25 000 [21 000–30 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	16 000 [13 000–19 000]	15 000 [13 000–18 000]	13 000 [10 000–15 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Criminalisation partielle du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	La possession de drogues à usage personnel est considérée comme un délit pénal
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 16 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2005	2016
	70,4	53,2
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois		2012
		2,7
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement		2012
		3,1


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2015	US\$ 1 394 264	US\$ 1 920 965	...	US\$ 6 725 861	...	US\$ 12 756 882


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-30%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **14%**



Rapport incidence/prévalence = **0,04**




POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	20 763	9 265	2 991	...	8 630
Prévalence du VIH	6,6%	41,9%	1,6%	...	2%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral	19,7%	...	14,3%
Utilisation du préservatif	94,1%	72,6%	42,7%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	1400 [910-1900]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	3,4%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné (2017)	87,8%
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	71% [59-84%]	54% [45-64%]	41% [34-48%]
Enfants (0-14)	34% [28-41%]	25% [20-29%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	81% [66- >95%]	62% [51-74%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	66% [52-80%]	50% [40-61%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? ...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2016)	
— Femmes	25,7%
— Hommes	32,4%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant) (2014)	
— Femmes	...
— Hommes	68,9%
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2016)	48,6%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...

Réduction des risques

— Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection	...
— Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection (2017)	131,01
— Couverture du traitement de substitution des opioïdes (2017)	57%
— Naloxone disponible (2016)	Non
— Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	23% [20-27%]	53% [44-62%]
Diagnostic précoce du nourrisson	11% [9-12%]	23% [20-28%]

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	6500 [5600–7900]	4900 [4100–5800]	3200 [2000–4800]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	990 [810–1200]	1300 [1000–1500]	560 [<500–930]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	3000 [2600–3700]	2000 [1600–2400]	1500 [920–2200]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	2500 [2000–3200]	1600 [1300–2000]	1200 [740–1900]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	1,2 [1,04–1,47]	0,78 [0,65–0,94]	0,44 [0,28–0,66]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	2200 [1700–3000]	2900 [2300–3700]	2600 [2100–3200]
Décès liés au sida (0–14)	560 [<500–680]	750 [620–900]	<500 [<500–660]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	880 [640–1200]	1100 [900–1500]	840 [650–1100]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	750 [540–1100]	1000 [780–1400]	1300 [1100–1600]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	46 000 [39 000–54 000]	58 000 [52 000–64 000]	61 000 [51 000–73 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	2900 [2300–3600]	4800 [4000–5600]	5500 [4400–6700]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	24 000 [21 000–28 000]	30 000 [27 000–33 000]	32 000 [27 000–39 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	19 000 [16 000–23 000]	23 000 [20 000–27 000]	23 000 [18 000–29 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Autre réglementation punitive du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Criminalisées
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 18 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH	2008	2013
	68,9	53,4
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois		2013
		1,2
Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement		2013
		8


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois	2013
	28,7


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2011	US\$ 40 385	US\$ 168 584	US\$ 2 957 997	US\$ 3000	US\$ 643 126	US\$ 20 905 243


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-34%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-11%**




Rapport incidence/prévalence = **0,05**



POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	3 400	...
Prévalence du VIH	...	14%	8,5%	...	5,9%
Connaissent leur statut VIH
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	14,9%	32,2%	32,1%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



	47% [39–56%]	39% [33–47%]	24% [20–29%]
Tous les âges	...	18%	...
Enfants (0–14)	...	53%	...
Femmes (15+)	26%	25%	15%
Hommes (15+)	[21–33%]	[20–31%]	[12–19%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**

ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	35% [28–41%]	89% [67–>95%]
Diagnostic précoce du nourrisson	1% [0–1%]	7% [6–10%]

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	3100 [2000–4500]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	9,1%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15–24 ans	...
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitants)	...
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2013)	49%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...

Réduction des risques

Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection (2014)	40,7%
Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection	...
Couverture du traitement de substitution des opioïdes	...
Naloxone disponible (2016)	Non
Salles d'injection sûres disponibles (2016)	Non

ESTIMATIONS ÉPIDÉMIQUES

	2005	2010	2017
Nouvelles infections par le VIH			
Nouvelles infections par le VIH (tous les âges)	10 000 [4300–17 000]	6700 [2800–11 000]	4900 [2100–8300]
Nouvelles infections par le VIH (0–14)	2700 [1200–4500]	2200 [980–3700]	1200 [510–1900]
Nouvelles infections par le VIH (femmes, 15+)	4600 [1700–7900]	2800 [1000–4700]	2300 [870–3900]
Nouvelles infections par le VIH (hommes, 15+)	3000 [1100–5200]	1800 [650–3000]	1500 [550–2500]
Incidence du VIH pour 1000 personnes	1,91 [0,79–3,24]	1,08 [0,44–1,83]	0,65 [0,27–1,1]
Décès liés au sida			
Décès liés au sida (tous les âges)	7300 [4000–12 000]	6900 [3800–11 000]	4700 [2500–7700]
Décès liés au sida (0–14)	1700 [860–3000]	1600 [780–2700]	870 [<500–1500]
Décès liés au sida (femmes, 15+)	3100 [1500–5400]	3200 [1500–5400]	1900 [930–3300]
Décès liés au sida (hommes, 15+)	2500 [1500–3900]	2200 [1300–3400]	1900 [1100–3000]
Personnes vivant avec le VIH			
Personnes vivant avec le VIH (tous les âges)	120 000 [76 000–160 000]	110 000 [75 000–160 000]	110 000 [70 000–150 000]
Personnes vivant avec le VIH (0–14)	12 000 [7300–18 000]	14 000 [8500–21 000]	12 000 [7300–18 000]
Personnes vivant avec le VIH (femmes, 15+)	63 000 [42 000–88 000]	62 000 [41 000–86 000]	59 000 [40 000–83 000]
Personnes vivant avec le VIH (hommes, 15+)	41 000 [27 000–58 000]	38 000 [25 000–54 000]	34 000 [22 000–49 000]

LOIS ET POLITIQUES

Lois criminalisant la transmission, la non-divul-gation ou l'exposition à la transmission du VIH	Oui
Criminalisation du travail du sexe	Autre réglementation punitive du travail du sexe
Criminalisation des actes sexuels entre personnes du même sexe	Oui, emprisonnement (jusqu'à 14 ans)
L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit	L'utilisation ou la possession de drogue pour sa consommation personnelle est un délit spécifique au regard de la loi
Criminalisation des personnes transgenres	Ni criminalisées, ni poursuivies
Lois ou politiques restreignant l'entrée, le séjour et la résidence des personnes vivant avec le VIH	Non
Consentement parental pour l'accès des adolescents au dépistage du VIH	Oui, pour les adolescents âgés de moins de 14 ans
Consentement de l'époux à un accès aux services SSR pour les femmes mariées	Non
Dépistage VIH obligatoire pour les permis de mariage, de travail ou de résidence ou pour certains groupes	Non

STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

Pourcentage des femmes et des hommes âgés de 15–49 ans qui rapportent des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH **2014**
45,8

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH s'étant vues refuser l'accès à des services de santé en raison de leur statut VIH au cours des 12 derniers mois

Pourcentage des personnes vivant avec le VIH ayant rapporté qu'un professionnel de santé avait informé d'autres personnes de leur statut VIH, sans leur consentement


VIOLENCE

Proportion de femmes de 15 à 49 ans mariées ou en partenariat qui ont été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime masculin au cours des 12 derniers mois **2014**
12,7


DÉPENSES

	Sources de financement					Total
	Privé Domestique	Public Domestique	International : PEPFAR	International : Financement mondial	International : tous les autres	
Dernier rapport disponible : 2016	US\$ 2 939 725	US\$ 2 014 854	...	US\$ 16 143 937	...	US\$ 24 594 123


MESURES DE LA TRANSITION ÉPIDÉMIQUE




Variation en pourcentage des nouvelles infections par le VIH depuis 2010 = **-27%**



Modifications en matière de décès liés au SIDA depuis 2010 = **-32%**



Rapport incidence/prévalence = **0,05**



Nouvelles infections par le VIH
Décès chez les personnes vivant avec le VIH


POPULATIONS CLÉS

	Professionnels du sexe	Hommes homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	Consommateurs de drogues injectables	Personnes transgenre	Prisonniers
Taille estimée de la population	10 284	7 649	2 289	...	4 122
Prévalence du VIH	13,2%	22%	2,8%
Connaissent leur statut VIH	44,7%
Couverture traitement antirétroviral
Utilisation du préservatif	86,4%	80,2%	25,8%
Couverture des programmes de prévention du VIH
Évitement des soins de santé en raison de la stigmatisation et de la discrimination

COMORBIDITÉS DU VIH

Nombre estimé de cas incidents de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH (2016)	770 [500-1100]
Proportion des personnes vivant avec le VIH récemment impliquées dans des soins VIH ayant une tuberculose active (2016)	62%
Dépistage du cancer cervical chez les femmes vivant avec le VIH	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite B recevant un traitement combiné	...
Proportion des personnes coinfectées par le VIH et le virus de l'hépatite C commençant un traitement de l'hépatite C	...

TEST ET TRAITEMENT DU VIH EN CASCADE



Tous les âges	66% [43-92%]	57% [37-80%]	...% [...-...%]
Enfants (0-14)	37% [22-56%]	30% [18-46%]	...% [...-...%]
Femmes (15+)	79% [53- >95%]	72% [48- >95%]	...% [...-...%]
Hommes (15+)	53% [34-75%]	39% [26-56%]	...% [...-...%]

Est-ce qu'un traitement antirétroviral est fourni au sein de la communauté (comme dans des établissements de santé externes) aux personnes qui sont stables sous traitement antirétroviral ? **Non**


ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION DE LA MÈRE À L'ENFANT

	2010	2017
Pourcentage des femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux	33% [21-47%]	66% [41-93%]
Diagnostic précoce du nourrisson	14% [10-23%]	36% [25-57%]

PRÉVENTION DU VIH

Connaissance de la prévention du VIH parmi les jeunes âgés de 15-24 ans (2014)	
— Femmes	23,3%
— Hommes	31,6%
Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel à plus haut risque (avec un partenaire extra-conjugal, non cohabitant) (2014)	
— Femmes	42,9%
— Hommes	60,7%
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans dont la demande de planification familiale est satisfaite par des méthodes modernes (2014)	37,4%
Hommes âgés de 15 à 49 ans circoncis (2014)	Sans objet
Circoncisions masculines réalisées selon les normes nationales	Sans objet
Personnes ayant reçu le PrEP au moins une fois pendant la période considérée (2017)	...
Réduction des risques	

- Utilisation d'un équipement d'injection stérile lors de la dernière injection
- Aiguilles et seringues distribuées par la personne qui procède à l'injection
- Couverture du traitement de substitution des opioïdes
- Naloxone disponible (2016)
- Salles d'injection sûres disponibles (2016)



MÉTHODES

Méthodes utilisées pour calculer les estimations de l'ONUSIDA

INTRODUCTION

L'ONUSIDA fournit chaque année des estimations modélisées révisées aux niveaux mondial, régional et national, en utilisant les meilleures données épidémiologiques et programmatiques disponibles pour suivre l'épidémie de VIH. Des estimations modélisées sont nécessaires car il est impossible de compter le nombre exact de personnes vivant avec le VIH, de personnes nouvellement infectées par le VIH ou de personnes décédées d'une maladie liée au sida dans un pays donné : il faudrait pour cela tester régulièrement chaque personne pour le VIH, et enquêter sur tous les décès, ce qui est impossible sur le plan logistique et problématique sur le plan éthique. Les estimations modélisées, ainsi que les seuils inférieur et supérieur encadrant ces estimations, fournissent une approche scientifiquement appropriée pour décrire les niveaux et les tendances relatives à l'épidémie du VIH.

PARTENARIATS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES POUR LES ESTIMATIONS DE L'ONUSIDA

Les équipes du pays utilisent un logiciel appuyé par l'ONUSIDA pour élaborer des estimations annuelles. Les équipes du pays sont principalement composées de démographes, d'épidémiologistes, de spécialistes du suivi et de l'évaluation, et de partenaires techniques.

Le logiciel utilisé pour produire les estimations est Spectrum, développé par Avenir Health, et le progiciel 'Estimations et projections', développé par le Centre Est-Ouest.¹ Le groupe de référence de l'ONUSIDA sur les estimations, la modélisation et les projections fournit des conseils techniques sur le développement de la composante VIH du logiciel.²

BRÈVE DESCRIPTION DES MÉTHODES UTILISÉES PAR L'ONUSIDA POUR GÉNÉRER SES ESTIMATIONS

Dans les pays où la transmission du VIH est suffisamment élevée pour alimenter une épidémie dans la population en général, les données épidémiologiques disponibles sont généralement les résultats de prévalence du VIH

obtenus auprès de femmes enceintes fréquentant des cliniques prénatales et d'enquêtes de population représentatives du pays. Dans le passé, de nombreux pays ont mis en place une surveillance sentinelle du VIH chez les femmes fréquentant les cliniques prénatales, ce qui nécessite la collecte de données auprès d'une sélection de cliniques pendant plusieurs mois, à quelques années d'intervalle. Plus récemment, de nombreux pays ont arrêté la surveillance sentinelle et utilisent maintenant les données des tests VIH de routine effectués lorsque des femmes enceintes dans des cliniques prénatales sont testées dans le cadre de programmes de prévention de la transmission mère-enfant. Ces données évitent d'avoir à mener un effort de surveillance distinct et fournissent un ensemble complet de données provenant de toutes les cliniques, plutôt que des échantillons provenant de sites spécifiques.

Les tendances de la prévalence chez les femmes enceintes dans les cliniques prénatales, qu'elles soient déterminées à partir de données de surveillance ou de routine, peuvent être utilisées pour éclairer les estimations des tendances de prévalence au niveau national, tandis que les données d'enquêtes de population - moins fréquentes mais couvrant davantage de régions géographiques et incluant également les hommes - sont plus utiles pour former des estimations des niveaux de prévalence du VIH au niveau national. Les données de ces enquêtes contribuent également à l'estimation des niveaux et des tendances de la prévalence du VIH par âge et par sexe. Pour quelques pays d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas mené d'enquêtes de population, les niveaux de prévalence du VIH sont ajustés en fonction de comparaisons entre la surveillance des consultations prénatales et les données d'enquêtes de population d'autres pays de la région. Les tendances de la prévalence du VIH et le nombre de personnes sous traitement antirétroviral sont ensuite utilisés pour obtenir une estimation des tendances de l'incidence du VIH.

Historiquement, les pays à forte transmission du VIH ont produit des tendances distinctes de prévalence et d'incidence du VIH pour les zones rurales et urbaines lorsqu'il existe des différences géographiques bien

¹ Pour plus d'informations sur Avenir Health, consultez le site www.avenirhealth.org. Le site Web East – West Centre est disponible à l'adresse www.eastwestcenter.org.

² Pour plus d'informations sur le Groupe de référence de l'ONUSIDA sur les estimations, la modélisation et les projections, veuillez visiter www.epidem.org.

établies en termes de prévalence. Pour mieux décrire et rendre compte d'une hétérogénéité géographique accrue, un nombre croissant de pays ont produit des estimations infranationales (par exemple au niveau de la province ou de l'État) qui, dans certains cas, tiennent également compte des différences entre zones rurales et zones urbaines. Ces estimations et tendances infranationales ou rurales-urbaines sont ensuite agrégées pour obtenir des estimations nationales.

Dans les autres pays, où la transmission du VIH se produit principalement parmi les populations-clés les plus exposées au risque d'infection par le VIH et où l'épidémie peut être qualifiée de faible niveau, les estimations proviennent de la surveillance des populations-clés et de la population générale à faible risque ou des données de déclaration des cas de VIH, en fonction des données les plus fiables pour un pays donné. Dans les pays disposant de données de surveillance du VIH de haute qualité parmi les populations-clés, les données provenant d'études répétées sur la prévalence du VIH axées sur les populations-clés sont utilisées pour dériver des estimations et des tendances nationales. Les estimations de la taille des populations-clés sont de plus en plus calculées de manière empirique dans chaque pays ; lorsque des études ne sont pas disponibles, elles sont dérivées des valeurs régionales et du consensus des experts. D'autres sources de données, notamment les données de déclaration des cas de VIH, les enquêtes de population et la surveillance auprès des femmes enceintes, sont utilisées pour estimer la prévalence du VIH dans la population générale à faible risque. Les courbes de prévalence du VIH et le nombre de personnes sous traitement antirétroviral sont ensuite utilisés pour établir les tendances de l'incidence du VIH au niveau national.

Pour la plupart des pays d'Europe occidentale et centrale et d'Amérique du Nord, ainsi que de nombreux pays d'Amérique latine, des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, dont les données issues de la surveillance du VIH ou des enquêtes sont insuffisantes, mais qui ont des systèmes de notification des maladies robustes, la déclaration des cas de VIH et les données de mortalité liées au SIDA issues des systèmes d'enregistrement de l'état civil sont directement utilisées pour documenter les tendances et les niveaux de prévalence et d'incidence du VIH au niveau national. Ces méthodes permettent également aux pays de

prendre en compte les preuves de la sous-déclaration ou des retards de déclaration dans les données des rapports de cas de VIH, ainsi que de la classification erronée des décès dus à une maladie liée au sida.

Dans tous les pays où l'ONUSIDA soutient l'établissement d'estimations, des hypothèses concernant l'efficacité de l'extension du programme de lutte contre le VIH et les schémas de transmission du VIH et de progression de la maladie sont utilisés pour obtenir des estimations spécifiques à l'âge et au sexe des (a) personnes vivant avec le VIH (b) personnes nouvellement infectées par le VIH, (c) personnes décédées d'une maladie liée au sida et (d) d'autres indicateurs importants (y compris les statistiques de couverture du programme de traitement). Ces hypothèses reposent sur des analyses systématiques de la littérature et des analyses des données d'études de recherche effectuées par des experts scientifiques. Les données démographiques de la population, y compris les estimations de la fécondité, sont extraites des données de la Division de la population du Bureau des Nations Unies pour la population en 2017.

Certains éléments du modèle, notamment le nombre de personnes sous traitement antirétroviral et le nombre de femmes ayant recours aux services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH par type de schéma thérapeutique, sont examinés et validés en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) et certains partenaires techniques.

Les fichiers finaux soumis par les pays contenant les produits modélisés sont examinés à l'ONUSIDA afin de garantir que les résultats sont comparables entre régions et pays et dans le temps.

LIMITES D'INCERTITUDE AUTOUR DES ESTIMATIONS DE L'ONUSIDA

Le logiciel d'estimation calcule les limites d'incertitude autour de chaque estimation. Ces limites définissent la plage dans laquelle se trouve la valeur vraie (si elle peut être mesurée). Des limites étroites indiquent qu'une estimation est précise, tandis que les limites larges indiquent une plus grande incertitude quant à l'estimation.

Dans les pays qui utilisent des données de surveillance du VIH, la quantité et la source des données disponibles déterminent en partie la précision des estimations : les pays disposant de plus de données de surveillance du VIH ont des fourchettes moins étendues que les pays ayant moins de données de surveillance ou des échantillons plus petits. Les pays dans lesquels une enquête de population nationale a été menée ont généralement des fourchettes plus petites autour des estimations que les pays où de telles enquêtes ne l'ont pas été, tandis que les pays produisant des estimations infranationales au niveau provincial ont des fourchettes plus larges. Dans les pays qui utilisent les données de déclaration de cas de VIH et de mortalité liée au sida, le nombre d'années de données et l'ampleur des cas signalés ou des décès dus à une maladie liée au sida contribueront à la précision de l'estimation.

Les hypothèses nécessaires pour arriver à l'estimation contribuent également à la largeur des fourchettes autour des estimations : en résumé, plus on pose d'hypothèses, plus la fourchette d'incertitude est large, chaque hypothèse introduisant des incertitudes supplémentaires. Par exemple, les fourchettes autour des estimations de la prévalence du VIH chez les adultes sont plus petites que celles autour de l'estimation de l'incidence du VIH chez les enfants qui nécessite des données supplémentaires sur la prévalence chez les femmes enceintes et la probabilité de transmission du VIH de la mère à l'enfant, qui ont chacune leur propre incertitude supplémentaire.

L'ONUSIDA est convaincu que le nombre réel de personnes vivant avec le VIH, de personnes nouvellement infectées par le VIH ou de personnes décédées d'une maladie liée au sida se situe dans les fourchettes indiquées. Avec le temps, des données plus nombreuses et de meilleure qualité provenant des pays réduiront progressivement les incertitudes.

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU MODÈLE D'ESTIMATION DE L'ONUSIDA POUR 2018

Les équipes des pays créent de nouveaux fichiers Spectrum chaque année. Les fichiers peuvent différer d'une année à l'autre pour deux raisons. Premièrement, les nouvelles données de surveillance et de programme sont entrées dans le modèle ; cela peut changer les tendances de la prévalence et de l'incidence du VIH au fil du temps, y compris au cours des dernières années. Deuxièmement, des améliorations sont incorporées au

modèle sur la base des dernières méthodes scientifiques et statistiques disponibles, qui ont conduit à la création de tendances plus précises de l'incidence du VIH. En raison de ces améliorations du modèle et de l'ajout de nouvelles données pour créer les estimations, les résultats des années précédentes ne peuvent pas être comparés à ceux de cette année. Cependant, un ensemble historique complet d'estimations est créé chaque année, permettant de décrire les tendances dans le temps.

Entre les estimations précédentes et celles de 2018, les modifications suivantes ont été appliquées au modèle sous la direction du groupe de référence de l'ONUSIDA sur les estimations, la modélisation et les projections, sur la base des dernières preuves scientifiques.

- Les données démographiques des modèles ont été mises à jour à partir des estimations de World Population Prospects 2015 par rapport à celles de 2017.
- Des hypothèses sur le maintien sous traitement antirétroviral chez les femmes enceintes vivant avec le VIH ont été incluses.
- Les données de routine agrégées sur la prévalence chez les femmes fréquentant les cliniques prénatales sont maintenant utilisées pour estimer le nombre de femmes vivant avec le VIH qui accouchent.
- Les hypothèses sur les tendances de la prévalence du VIH chez les femmes enceintes par rapport aux tendances dans la population générale ont été mises à jour.
- Les probabilités annuelles de mortalité par le VIH parmi les personnes sous traitement en Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord ont été révisées sur la base d'une analyse spécifique menée par la Collaboration sur la cohorte du traitement antirétroviral.
- Une option a été ajoutée dans le modèle pour donner la priorité à l'attribution de traitement aux personnes présentant le plus faible nombre de CD4 et n'ayant pas encore commencé le traitement.
- Une nouvelle approche permettant d'adapter des modèles d'incidence plus complexes aux pays utilisant les données de déclaration des cas et d'enregistrement des faits vitaux est disponible.

- De nouvelles méthodes permettant d'estimer la proportion de personnes décédant avant le diagnostic et le délai entre l'infection et le diagnostic ont été intégrées au modèle pour les pays utilisant les données de déclaration des cas pour estimer l'incidence.

Des informations plus détaillées sur les révisions du modèle 2018 et de Spectrum en général sont disponibles sur www.epidem.org.

MESURER LA COUVERTURE DU TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

Depuis 2013, l'ONUSIDA fournit le nombre et les estimations de la proportion de tous les adultes et enfants vivant avec le VIH qui suivent un traitement antirétroviral (par opposition à ceux éligibles à un traitement conformément aux directives nationales ou internationales). Cette méthode d'estimation de la couverture reflète les recommandations de l'OMS de commencer le traitement antirétroviral chez toutes les personnes diagnostiquées séropositives.

Les pays déclarent le nombre de personnes sous traitement à l'aide de l'outil de surveillance mondiale du SIDA (GAM) et de Spectrum. Bien que ces valeurs proviennent de données de routine, elles peuvent présenter un certain degré d'incertitude si le pays ne peut pas dédupliquer les personnes susceptibles de recevoir des médicaments de deux cliniques différentes ou en cas de retard dans la communication des données. En utilisant les résultats des examens de la qualité des données effectués jusqu'en 2016, une incertitude estimée à - 0,88 et 1,04 pour les limites inférieure et supérieure, respectivement, a été ajoutée au nombre de personnes sous traitement aux niveaux régional et mondial.

PUBLICATION D'ESTIMATIONS PAR PAYS

L'ONUSIDA a pour objectif de publier des estimations pour tous les pays comptant 250 000 habitants ou plus en 2017. Pour les pays de 250 000 habitants ou plus qui n'ont pas soumis d'estimations, l'ONUSIDA a développé des estimations à l'aide du logiciel Spectrum, fondées sur des informations publiées ou autrement disponibles. Ces estimations ont contribué aux totaux régionaux et globaux mais n'ont pas été publiées en tant qu'estimations par pays.

Dans les pays à épidémie faible, le nombre de femmes enceintes vivant avec le VIH est difficile à estimer. Beaucoup de femmes vivant avec le VIH dans ces pays sont des travailleuses du sexe ou des personnes qui consomment de la drogue, ou qui sont les partenaires sexuels d'homosexuels et d'autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ou de personnes qui font usage de drogue, ce qui les rend susceptibles d'avoir un taux de fécondité différent de celui de la population générale. L'ONUSIDA ne présente pas d'estimations de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, y compris les estimations relatives aux enfants dans certains pays où l'épidémie est concentrée, à moins que des données suffisantes ne soient disponibles pour valider ces estimations. L'ONUSIDA ne publie pas non plus ces estimations pour les pays où le nombre estimé de femmes enceintes vivant avec le VIH est inférieur à 100.

En ce qui concerne les tendances en matière de signalisation des tendances d'incidence, s'il n'y a pas suffisamment de données historiques pour indiquer avec certitude si une baisse de l'incidence a eu lieu, l'ONUSIDA ne publie pas de données autres que celles de l'année la plus récente. Cela afin d'empêcher que les utilisateurs tirent des conclusions inexactes sur les tendances. Plus précisément, les tendances d'incidence ne sont pas publiées s'il y a moins de quatre points de données pour la population-clé ou s'il n'y a pas eu de données pour les quatre dernières années pour les pays utilisant des données d'enquêtes répétées ou de tests de routine. Les tendances antérieures à l'année 2000 ne sont pas publiées pour les pays utilisant des modèles de surveillance des cas si aucune donnée de surveillance précoce des cas ou de mortalité n'est disponible.

Enfin, l'ONUSIDA ne publie pas d'estimations par pays lorsque de nouvelles données ou analyses sont nécessaires pour produire des estimations valables. Vous trouverez plus d'informations sur les estimations de l'ONUSIDA et les fichiers Spectrum individuels de la plupart des pays sur le site Web de l'ONUSIDA (www.unaids.org). Les estimations résultantes sont disponibles dans la section Aidsinfo du site Web de l'ONUSIDA (<http://aidsinfo.unaids.org/>).

Méthodes pour dériver les objectifs 90–90–90

INTRODUCTION

À partir de 2016, l'ONUSIDA a fourni des estimations des progrès accomplis à l'échelle mondiale, régionale et par pays par rapport aux cibles 90–90–90. Les progrès dans la réalisation de ces objectifs sont directement contrôlés à l'aide de trois indicateurs de base :

- Indicateur 1 (la première cible 90) : pourcentage de toutes les personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut VIH.
- Indicateur 2 (la deuxième cible 90) : pourcentage de personnes qui connaissent leur statut séropositif et qui ont accès à un traitement.
- Indicateur 3 (la troisième cible 90) : pourcentage de personnes sous traitement présentant une suppression virale.

Les mesures liées aux indicateurs 2 et 3 peuvent également être exprimées en pourcentage de toutes les personnes vivant avec le VIH. Lorsque le nombre ou la couverture de la cible de traitement sont exprimés par rapport au nombre total de personnes vivant avec le VIH, on parle de « cascade de tests et de traitements du VIH ». En utilisant cette approche, les deuxième et troisième cibles 90–90–90 se traduisent par une couverture de 81 % du traitement antirétroviral et par 73 % des personnes en suppression virale d'ici à 2020.

L'ONUSIDA a publié sa première série de cascades de tests et de traitements aux niveaux mondial et régional en 2015. Les estimations de la couverture du traitement antirétroviral parmi les personnes vivant avec le VIH remontent à la mise en place du traitement. Les résultats présentés dans ce rapport remplacent les valeurs précédemment publiées pour 2015 et 2016.

Depuis 2015, l'ONUSIDA a également suivi les progrès accomplis dans la réalisation des cibles 90–90–90 en surveillant l'accès aux tests de charge virale chez les personnes en traitement. Si la plupart des habitants du pays subissent chaque année un test de charge virale, comme le recommande l'OMS, nous pouvons avoir confiance en la précision de l'estimation de la suppression du virus chez toutes les personnes vivant avec le VIH.

MÉTHODES DE MESURE DES CIBLES 90–90–90

Pour décrire les progrès réalisés au niveau des pays par rapport aux cibles 90–90–90, l'ONUSIDA a analysé des données sur le nombre de personnes connaissant leur statut VIH, le nombre de personnes sous traitement et le nombre de personnes ayant présenté une suppression virale parmi les personnes testées, comme indiqué via l'outil GAM et Spectrum.

Une description du système GAM et des indicateurs liés aux objectifs de traitement auxquels les pays se rapportent est fournie dans les directives de l'ONUSIDA GAM 2018(1). Toutes les données de programme soumises à l'ONUSIDA, y compris le nombre de personnes ayant déclaré connaître leur statut, le nombre de personnes bénéficiant d'un traitement et le nombre de personnes sous traitement qui présentent une suppression virale, ont été validées par l'ONUSIDA et ses partenaires avant publication.

Les données soumises par les pays qui ne remplissaient pas les contrôles de validation requis pour la qualité, que ce soit au niveau de l'indicateur ou sur l'ensemble de la cascade de traitements, n'ont pas été publiées. Tous les pays n'ont pas été en mesure de faire rapport sur les trois volets des cibles 90–90–90.

La série finale de mesures des progrès par pays par rapport aux cibles 90–90–90 pour 2015 à 2017 est disponible à l'adresse <http://aidsinfo.unaids.org>. Des cascades complètes de traitement étaient disponibles pour 53 pays en 2017. Les fourchettes d'incertitude supérieure et inférieure des estimations au niveau des pays ont été calculées à partir de la fourchette estimée du nombre de personnes vivant avec le VIH. Cette plage peut ne pas saisir complètement l'incertitude dans les données de programme déclarées.

Pour estimer les progrès régionaux et mondiaux par rapport aux cibles 90–90–90, l'ONUSIDA a complété les données fournies par les pays via GAM avec celles obtenues à partir d'un examen d'autres sources de données publiées et non publiées, notamment la littérature grise et les résultats des enquêtes démographiques et de santé. Les données rapportées

par les pays d'Europe occidentale et centrale et d'Amérique du Nord en 2017 étaient insuffisantes pour présenter les résultats pour la région, bien que les valeurs de pays disponibles dans la région aient été utilisées pour construire les totaux globaux. Les fourchettes d'incertitude supérieure et inférieure des estimations mondiales et régionales ont été calculées à partir de la fourchette de nombres de personnes vivant avec le VIH et des fourchettes inférieure et supérieure du nombre de personnes sous traitement dans la région. Cette plage peut ne pas saisir complètement l'incertitude dans les données de programme signalées ou manquantes pour les premier et troisième indicateurs.

SOURCES DE DONNÉES ET MÉTHODES SPÉCIFIQUES À CHAQUE INDICATEUR POUR DÉRIVER LES MÉTHODES MONDIALES ET RÉGIONALES

Estimations des personnes vivant avec le VIH

Sauf indication contraire, toutes les mesures des progrès présentées dans ce rapport sont basées sur des estimations modélisées du nombre de personnes vivant avec le VIH de Spectrum, aux niveaux mondial, régional et spécifique à l'ONUSIDA. Des estimations du nombre de personnes vivant avec le VIH étaient disponibles pour 169 pays. On trouvera plus de détails sur la façon dont l'ONUSIDA calcule les estimations et les limites d'incertitude concernant le nombre de personnes vivant avec le VIH et ayant accès à un traitement antirétroviral, à la rubrique « Mesure de la couverture du traitement antirétroviral » (ci-dessus, dans la première partie de la présente annexe).

Connaissance du statut VIH chez les personnes vivant avec le VIH

Les mesures mondiales et régionales du nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut ont été calculées à l'aide des données de surveillance du programme de surveillance du VIH les plus récentes, des données d'enquêtes de population représentatives au niveau national et d'estimations modélisées pour 102 pays en 2017. Lorsque les données étaient disponibles séparément pour les enfants (âgés de 0 à 14 ans) et les adultes (âgés de 15 ans et plus), les mesures spécifiques à l'âge étaient d'abord calculées puis agrégées pour produire une mesure nationale.

Pour 80 pays en 2017, le nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissaient leur statut VIH est basé sur les systèmes de surveillance du VIH, sur les registres de programmes ou sur les estimations modélisées dérivées de la surveillance des cas et des données de programme. Si la mesure provenant de ces sources était inférieure au nombre de personnes ayant accès à un traitement antirétroviral, la valeur rapportée était exclue de l'analyse et remplacée par une estimation dérivée à l'échelle régionale. Pour les pays utilisant des données de surveillance du VIH ou des programmes, la mesure d'un pays n'a été incluse que si le système de surveillance du VIH fonctionnait depuis avant 2008. Les pays dotés de systèmes plus récents n'ont peut-être pas pris en compte toutes les personnes vivant avec le VIH diagnostiquées avant 2008.

Bien que les systèmes de surveillance du VIH, y compris ceux basés sur les registres de programmes, puissent constituer une source de données raisonnablement robuste pour estimer le nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, des biais dans les chiffres rapportés peuvent encore exister. Par exemple, la mesure de la connaissance de la situation par un pays peut être sous-estimée si toutes les personnes diagnostiquées ne sont pas signalées au système de surveillance en temps voulu ; la mesure peut également être surestimée si des personnes sont signalées au système ou incluses dans un registre plusieurs fois et que ces doublons ne sont pas détectés. De même, si des personnes décèdent ou émigrent sans être retirées du système, le nombre de personnes vivant avec le VIH qui seraient au courant de leur statut VIH sera également surestimé.

Les estimations du nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissaient leur statut dans 14 pays d'Afrique subsaharienne en 2017 ont été calculées à partir d'enquêtes de population représentatives menées au niveau national depuis 2011 et de données sur les traitements communiquées par le biais du GAM. Quatre pays ayant mené des enquêtes jusqu'en 2017 ont directement demandé aux répondants séropositifs s'ils connaissaient leur statut VIH dans le cadre de l'enquête. Cette proportion a été appliquée au nombre total de personnes vivant avec le VIH dans le pays. Dans les 10 pays restants avec une enquête qui n'interrogeait pas directement les participants sur la connaissance de leur statut VIH, une approche par étapes a été utilisée pour estimer la connaissance du statut.

- Dans la première étape, le pourcentage total de personnes pouvant connaître leur statut au cours de l'année de la dernière enquête est estimé. Pour les adultes, ce pourcentage est estimé en calculant le pourcentage de personnes séropositives de l'enquête qui ont déclaré avoir déjà subi un test de dépistage du VIH et qui ont reçu le résultat du dernier test. Pour les enfants qui ne sont pas inclus dans l'enquête, une mesure indirecte de la couverture du traitement au cours de l'année de l'enquête est utilisée pour estimer la connaissance de leur statut chez les enfants. Il s'agit d'une mesure conservatrice, certains enfants n'ayant peut-être pas commencé le traitement. Pour estimer la connaissance du statut de toutes les personnes au cours de l'année de l'enquête, les estimations enfants et adultes sont combinées, pondérées par le nombre d'enfants et d'adultes vivant avec le VIH.
- Dans la deuxième étape, le pourcentage de personnes qui pourraient connaître leur statut au cours de l'année de déclaration en cours ou précédente est calculé en projetant les résultats de la première étape. Pour ce faire, on suppose que le taux d'accroissement du dépistage à l'ère du dépistage et du traitement était le même que le taux d'accroissement des personnes commençant un traitement, calculé par la différence en points de pourcentage de la couverture totale du traitement (pour les adultes et les enfants) entre l'année de l'enquête et la valeur de la couverture du traitement pour l'année en cours ou l'année précédente. Pour les enquêtes menées en 2017, les valeurs de 2015 et 2016 sont estimées pour les années précédentes en utilisant un processus similaire à celui décrit ci-dessus.
- Dans la troisième étape, l'estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut pour l'année est calculée en utilisant le point médian entre le pourcentage de personnes vivant avec le VIH qui pourraient connaître leur statut (c.-à-d. la deuxième étape) et le pourcentage de personnes vivant avec le VIH sous traitement.

La mesure de la connaissance du statut VIH sur la base des données d'enquête lorsque l'on ne demande pas directement aux participants s'ils savent que leur statut VIH a plusieurs limites. En règle générale, les estimations dérivées de ces enquêtes sous-estiment la connaissance de l'état pour trois raisons :

1. Dans les contextes où la stigmatisation et la discrimination sont ou ont été élevées, les personnes peuvent être réticentes à révéler qu'elles ont déjà fait un test de dépistage du VIH et ont reçu leurs résultats.
2. Les personnes qui déclarent avoir déjà passé un test peuvent avoir fait l'objet d'une séroconversion après le résultat de leur dernier test et sont donc considérées à tort comme conscientes de leur statut VIH.
3. La plupart des enquêtes qui n'interrogent pas directement les répondants sur leur statut VIH ont eu lieu avant 2017. Bien que les enquêtes menées avant 2011 aient été exclues, il est possible que la méthode d'ajustement basée sur l'intensification du traitement ne rende pas compte avec précision des augmentations de la connaissance de l'état survenues au fil du temps chez les personnes vivant avec le VIH.

La sous-estimation du nombre déclaré de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut peut également se produire dans les pays où les répondants à l'enquête sont directement interrogés sur leur statut vis-à-vis du VIH. Dans ces cas, le risque est que les participants à l'enquête ne divulguent pas leur statut VIH aux enquêteurs et soient classés à tort comme personnes ignorant leur état de santé. S'il est impossible de mesurer l'ampleur exacte de ce biais, lors d'enquêtes précédentes au Kenya, au Malawi et en Ouganda, un dixième à un tiers des participants séropositifs ont déclaré que leur statut VIH était négatif (2). Une sous-estimation de la connaissance du statut peut également se produire au niveau national si les personnes vivant avec le VIH apprennent leur statut à la suite ou après l'enquête, bien que cette proportion du nombre total de personnes dans un pays qui connaissent leur statut soit faible.

L'ONUSIDA a utilisé la littérature grise publiée et non publiée et les estimations historiques communiquées par le biais du GAM pour renseigner les valeurs régionales et globales de 34 pays qui n'avaient pas de mesure actuelle de la connaissance de la situation en 2017. Une méthode similaire utilisée pour projeter la connaissance estimée de l'état d'avancement des enquêtes directes à partir de données historiques a été appliquée aux estimations de ces pays avant 2017.

Pour 40 pays sans aucune estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, des pays où vivent à peine 8 % du nombre total estimé de personnes vivant avec le VIH dans le monde, la moyenne régionale du ratio du nombre de personnes qui connaissent leur statut et du nombre de patients sous traitement a été calculée à partir des données disponibles présentées par les pays de la région et pondérée en fonction du nombre de personnes vivant avec le VIH par pays. La connaissance du statut était limitée à 95 %. Les nombres totaux de personnes censées connaître leur statut VIH dans les pays ont été ajoutés pour la région et le monde afin de construire le numérateur de la première cible 90 et le dénominateur de la deuxième cible 90.

Personnes ayant accès à un traitement antirétroviral

Les mesures mondiales et régionales du nombre de traitements antirétroviraux sont calculées à partir des données de programme communiquées par les pays, à l'aide de GAM et du logiciel Spectrum soutenu par l'ONUSIDA. Pour un petit nombre de pays où les nombres déclarés de personnes sous traitement ne sont pas disponibles, principalement en Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord, des estimations du nombre de personnes sous traitement sont élaborées soit en consultation avec l'agence de santé publique responsable du suivi du programme national de traitement soit sur la base des sources publiées.

En partenariat avec l'UNICEF, l'OMS et d'autres partenaires qui soutiennent la fourniture de services de traitement dans les pays, l'ONUSIDA examine et valide les chiffres des traitements communiqués par GAM et Spectrum chaque année. Le personnel de l'ONUSIDA fournit également une assistance technique et une formation aux responsables de la santé publique et aux cliniciens des pays afin de garantir la qualité des données des traitements rapportées. Néanmoins, cette mesure peut surestimer le nombre de personnes sous traitement si les personnes transférées d'un établissement à un autre sont déclarées par les deux établissements. De même, la couverture peut être surestimée si les personnes décédées, désengagées des soins ou émigrées ne sont pas identifiées et retirées des registres de traitement. Le nombre des traitements peut également être sous-estimé si toutes les cliniques ne les déclarent pas complètement ou en temps voulu.

En 2016, l'ONUSIDA a achevé une triangulation des données afin de vérifier l'estimation globale par l'ONUSIDA du nombre de personnes ayant accès à un traitement antirétroviral à la fin de 2015. En 2018, l'ONUSIDA s'est associé à l'OMS, au Fonds mondial, à des partenaires techniques choisis et aux ministères de la santé de 28 pays (la plupart en Afrique subsaharienne) pour mener des examens de la qualité des données des traitements rapportés. Pour plus de détails sur le degré de confiance de l'ONUSIDA dans le nombre de traitements déclarés, veuillez consulter la page *Combien de personnes vivant avec le VIH ont-elles accès au traitement ?*³

Personnes ayant atteint la suppression virale

Les progrès vers la cible de suppression du virus chez les personnes sous traitement et en proportion de toutes les personnes vivant avec le VIH sont dérivés des données communiquées à GAM. À des fins de déclaration, le seuil de suppression est une charge virale inférieure à 1 000 copies par ml, bien que certains pays puissent définir des seuils plus bas ou exiger que les personnes atteignent une charge virale indétectable. Ces directives spécifient également que seuls les résultats des derniers tests de l'année de déclaration d'une personne doivent être soumis. Par conséquent, le nombre déclaré de personnes présentant une suppression virale parmi les personnes testées doit représenter des personnes et non des tests effectués.

Les directives de l'ONUSIDA GAM 2018 ont été mises à jour par rapport à celles de 2017 afin d'inclure un seuil de déclaration des résultats de suppression de la charge virale, de telle sorte que la couverture des tests soit accessible à tous ou presque (> 90 %), ou qu'elle soit représentative au niveau national des personnes sous traitement (généralement 50 à 90 % de couverture de dépistage). Pour les pays ayant un accès au traitement représentatif au niveau national mais pas universellement accessible, l'estimation de la suppression virale parmi ceux testés (c'est-à-dire la troisième cible 90) a été multipliée par le nombre de personnes sous traitement au niveau national pour obtenir des niveaux globaux de suppression virale dans le pays.

Sur la base d'un seuil de couverture plus strict, 67 pays ont communiqué des données sur la suppression de la charge virale à partir de systèmes de surveillance

³Ce document est disponible à l'adresse <http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/how-many-people-living-with-HIV-access-treatment>.

basés sur des cas ou de rapports en laboratoire en 2018 (contre 88 en 2017). Cinq pays disposaient d'estimations fondées sur des enquêtes de population représentatives au niveau national, dans lesquelles le test de la charge virale n'était effectué que parmi ceux qui s'étaient déclarés sous traitement.

Les estimations pour les pays restants ont été construites en utilisant la moyenne régionale du nombre de personnes sous traitement antirétroviral qui présentent une suppression virale, pondérée en fonction du nombre de personnes sous traitement dans un pays. Les nombres totaux des personnes qui présentent une suppression virale ont été ajoutés pour la région et le monde pour constituer la troisième cible 90 et l'estimation globale de la suppression virale chez les personnes vivant avec le VIH. La même approche a également été utilisée pour construire des estimations historiques régionale et mondiale.

L'utilisation des données déclarées par les pays pour surveiller la suppression de la charge virale pose un certain nombre de problèmes.

- Le test de routine de la charge virale peut ne pas être proposé dans toutes les installations de traitement, et les établissements où il est proposé peuvent ne pas être représentatifs des soins disponibles dans les établissements sans test de la charge virale. En supposant que le pourcentage de personnes qui présentent une suppression virale parmi celles qui accèdent à un test de charge virale soit représentatif de toutes les personnes sous traitement dans des pays où la prise en charge de la charge virale est incomplète, la mesure peut être soit surestimée, soit sous-estimée, en fonction des caractéristiques des services cliniques ayant fait la déclaration où le test est disponible.
- L'accès signalé aux tests de charge virale varie considérablement d'une région à l'autre, et il est difficile de savoir si l'expérience des pays ayant transmis des données à ONUSIDA est semblable à celle des pays de la même région qui n'ont pas communiqué de données. En Afrique occidentale et centrale, par exemple, seuls 7 pays sur 14 ont

communiqué des estimations de la suppression de la charge virale en 2017, ce qui représente seulement 14 % de toutes les personnes sous traitement dans la région. En Asie et dans le Pacifique, les estimations représentatives au niveau national de la suppression de la charge virale ne sont pas disponibles pour la Chine et l'Inde en 2017. En conséquence, les estimations pour cette région sont construites sur la base du quart restant de toutes les personnes ayant accès à un traitement dans la région où des données sur la suppression de la charge virale sont disponibles.

- Les directives de l'ONUSIDA ne demandent des résultats de test de routine de la charge virale (annuels) que pour les personnes sous traitement et éligibles pour le test. Si les personnes chez qui le traitement a été récemment instauré obtiennent une suppression virale mais ne se sont pas encore vues proposer un test de charge virale, elles seront incorrectement classées comme ne présentant pas de suppression et l'estimation de la suppression virale obtenue sera sous-estimée. L'ONUSIDA demande également aux pays de ne communiquer que les résultats des tests de routine de la charge virale ; si les pays rapportent des résultats de tests principalement effectués en raison d'un échec présumé du traitement, le nombre de personnes présentant une suppression virale dans ces pays sera sous-estimé. L'ONUSIDA valide les soumissions des pays en matière de qualité, mais il n'est pas toujours possible d'identifier les cas dans lesquels des tests de routine ou autres sont en cours.
- L'ONUSIDA recommande de ne communiquer les résultats des tests de charge virale qu'aux personnes sous traitement antirétroviral ; les personnes qui présentent une suppression virale naturelle et ne suivent pas de traitement ne seront pas incluses dans cette mesure.

À mesure que l'accès à la couverture de la charge virale se développe et que les systèmes de contrôle de routine sont renforcés pour compiler et rendre compte de ces données, la capacité de quantifier et éventuellement de réduire les biais dans les cibles 90–90–90 s'améliore.

Répartition des nouvelles infections par le VIH par sous-population

La répartition des nouvelles infections par le VIH par région a été estimée sur la base des données de 169 pays utilisant cinq sources de données.

Pour les pays qui modélisent leur épidémie de VIH sur la base de données provenant de sous-populations, y compris de populations-clés, le nombre de nouvelles infections a été extrait des fichiers Spectrum 2017. Cette source a fourni des données sur les travailleurs du sexe de 58 pays, sur les consommateurs de drogues injectables de 36 pays, sur les hommes homosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de 56 pays et sur les transgenres de 15 pays (tous situés en Amérique latine, Caraïbes et Asie). En outre, 21 pays (principalement d'Asie) disposaient de données provenant de clients de travailleurs du sexe.

Les études sur le mode de transmission menées dans les pays entre 2006 et 2012 constituent la deuxième source. Les proportions de nouvelles infections estimées pour chaque sous-population, calculées par des analyses des modes de transmission, ont été multipliées par le nombre total de nouvelles infections d'adultes spécifiques au sexe (parmi ceux âgés de 15 à 49 ans) pour obtenir un nombre estimé de nouvelles infections par sous-population. Cette source a fourni des données sur les travailleurs du sexe de 18 pays, sur les consommateurs de drogues injectables de 25 pays, ainsi que sur les hommes homosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de 22 pays.

Les nouvelles infections par le VIH dans les pays européens dépourvus des sources de données susmentionnées ont été dérivées des données de surveillance du VIH / SIDA en Europe du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et du Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (Europe) (3) *Surveillance du VIH / SIDA en Europe, données 2017-2016*. Les proportions de nouveaux diagnostics pour chaque région d'Europe (Ouest, Centre et Est) ont été

appliquées aux estimations de l'ONUSIDA relatives aux nouvelles infections dans chaque pays chez les consommateurs de drogues injectables, les hommes homosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les données relatives aux travailleurs du sexe n'étaient pas disponibles dans le rapport de l'ECDC. Les nouvelles infections par le VIH en Chine, dans la Fédération de Russie et aux États-Unis sont extraites des plus récents rapports nationaux disponibles sur les nouveaux diagnostics.

Les nouvelles infections par le VIH parmi les pays sans source de données directe ont été calculées à partir de points de repère régionaux. Les points de repère ont été établis en fonction de la proportion médiane de nouvelles infections dans la sous-population spécifique dans tous les pays disponibles dans la même région. La majorité de ces pays étaient situés en Afrique subsaharienne. 73 pays utilisaient des valeurs de référence pour l'estimation du travail du sexe, 95 pays pour les consommateurs de drogues injectables, 33 pays pour les hommes homosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et 36 pays pour l'estimation des personnes transgenres.

Les proportions calculées d'infections pour chaque population-clé incluent les partenaires sexuels des membres des populations-clés. Les nouvelles infections chez les partenaires sexuels des populations-clés ont été estimées à l'aide du nombre de partenaires sexuels et des probabilités de transmission tirées de la littérature.

Références

1. Rapport mondial sur le suivi de la lutte contre le sida 2018 : indicateurs de suivi de la Déclaration Politique sur la fin du sida adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2018 (http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf).
2. Johnston LG, Sabin ML, Prybylski D, Sabin K, McFarland W, Baral S et al. Policy and practice: the importance of assessing self-reported HIV status in bio-behavioural surveys. Bull World Health Organ. 2016; 94: 605-12.
3. Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe. Surveillance du VIH / SIDA en Europe, données 2017-2016. Stockholm : ECDC; 2017

Droits d'auteur: © 2018

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)
Tous droits réservés.

Les désignations employées dans la présente publication et les données qui y figurent n'impliquent l'expression d'aucune opinion de quelque nature que ce soit de la part de l'ONUSIDA concernant le statut légal d'aucun pays, territoire, ville ou zone ou de leurs autorités, ou concernant la délimitation de leurs frontières ou limites. L'ONUSIDA ne garantit pas que les informations publiées dans la présente publication sont complètes et correctes et ne saurait être tenu responsable d'aucun préjudice subi en raison de son utilisation.

ONUSIDA / JC2924 / Afrique occidentale et centrale

**AFRIQUE OCCIDENTALE
ET CENTRALE**

ONUSIDA
Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida

20 Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse

+41 22 791 3666

unaids.org