

HOJA INFORMATIVA 2023

Estadísticas mundiales sobre el VIH

- 39,0 millones [33,1 millones–45,7 millones] vivían con el VIH en todo el mundo en 2022.
 - 1,3 millones [1 millón–1,7 millones] contrajeron la infección por el VIH en 2022.
 - 630 000 [480 000-880 000] personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2022.
 - 29,8 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretroviral en 2022.
 - 85,6 millones [64,8 millones-113,0 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.
 - 40,4 millones [32,9 millones-51,3 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.
-

Personas que viven con el VIH

- En 2022, 39,0 millones [33,1 millones–45,7 millones] de personas vivían con el VIH.
 - 37,5 millones [31,8 millones-43,6 millones] de adultos (15 años o más).
 - 1,5 millones [1,2 millones-2,1 millones] de niños (hasta 14 años).
 - El 53 % de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas.
 - El 86 % [73- >98 %] de todas las personas que vivían con el VIH conocía su estado serológico con respecto al VIH en 2022.
 - Alrededor de 5,5 millones de personas no sabían que estaban viviendo con el VIH en 2022.
-

Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretroviral

- Al cierre de diciembre de 2022, 29,8 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral, una cifra superior a los 7,7 millones de 2010.
- En 2022, el 76 % [65-89 %] de todas las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento.
 - El 77 % [65-90 %] de los adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento, así como el 57 % [44-78 %] de los niños de hasta 14 años.
 - El 82 % [69-95 %] de las mujeres adultas mayores de 15 años tuvieron acceso al tratamiento; sin embargo, solo el 72 % [60-84 %] de los hombres adultos de 15 o más años de edad lo tuvieron.
- El 82 % [64-98 %] de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH a sus hijos en 2022.

Nuevas infecciones por el VIH

- Desde el pico alcanzado en 1995, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 59 %.
 - En 2022, se produjeron 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] de nuevas infecciones por el VIH, en comparación con los 3,2 millones [2,5 millones-4,3 millones] de 1995.
 - El 46 % de todas las nuevas infecciones en 2022 se dieron en mujeres y niñas.
- Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH descendieron alrededor de un 38 %, desde 2,1 millones [1,6 millones-2,8 millones] hasta 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] en 2022.
- Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 58 %, desde 310 000 [210 000-490 000] en 2010 hasta 130 000 [90 000-210 000] en 2022.

Muertes relacionadas con el sida

- Desde el pico alcanzado en 2004, los casos de muertes relacionadas con el sida se han reducido en más de un 69 %, y en un 51 % desde 2010.
- En 2022, alrededor de 630 000 [480 000-880 000] personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida en todo el mundo, frente a los 2,0 millones [1,5 millones-2,8 millones] de personas en 2004 y 1,3 millones [970 000-1,8 millones] de 2010.
- La mortalidad por el sida ha disminuido un 55 % entre las mujeres y niñas y un 47 % entre hombres y niños desde 2010.

Grupos de población clave

- En todo el mundo, la media de la prevalencia del VIH entre los adultos (de 15 a 49 años) fue del 0,7 %. Sin embargo, la media de la prevalencia fue mayor entre los grupos de población clave
 - 2,5 % entre los trabajadores sexuales
 - 7,7 % entre los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
 - 5,0 % entre las personas que se inyectan drogas
 - 10,3 % entre las personas trans
 - 1,4 % entre las personas en prisión
-

Mujeres y niñas

- En todo el mundo, el 46 % de todas las nuevas infecciones por el VIH en 2022 se produjeron entre mujeres y niñas (de todas las edades).
 - En el África subsahariana, las mujeres y las niñas (de todas las edades) representaron el 63 % de todas las nuevas infecciones por el VIH. En todas las demás zonas geográficas, más del 70 % de las nuevas infecciones por el VIH en 2022 se produjeron entre hombres y niños.
 - Cada semana, 4000 chicas adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contrajeron el VIH en todo el mundo en 2022. 3100 de estas infecciones se produjeron en el África subsahariana.
-

Objetivos de pruebas y tratamiento (95-95-95)

- En 2022, el 86 % [73- >98 %] de todas las personas que vivían con el VIH conocían su estado serológico. Entre las personas que conocían su estado, el 89 % [75- >98 %] tenían acceso al tratamiento. Y, entre las personas que tenían acceso al tratamiento, el 93 % [79- >98 %] habían logrado la supresión viral.
 - Entre los niños de 0 a 14 años, los objetivos de 95-95-95 fueron del 63 % [49 % - 86 %], el 91 % [71 % - >98 %] y el 81 % [63 %->98 %]. Entre las mujeres, los objetivos de 95-95-95 fueron: 90 % [76->98 %], 91 % [77->98 %] y 93 % [79->98 %].
 - Entre los hombres, los objetivos de 95-95-95 fueron: El 83 % [70-98 %] de los hombres adultos que vivían con el VIH conocía su estado serológico, el 86 % [72->98 %] tenía acceso al tratamiento y el 94 % [79->98 %] logró la supresión viral.
 - Entre todas las personas que vivían con el VIH, el 86 % [73- >98 %] conocía su estado serológico, el 76 % [65-89 %] tenía acceso al tratamiento y el 71 % [60-83 %] logró la supresión viral en 2022.
-

Inversiones

- A finales de 2022, había 20 800 millones de dólares estadounidenses (en dólares constantes de 2019) disponibles para la respuesta al sida en los países de ingresos bajos y medianos. Alrededor del 60 % del total de los recursos procedió de fuentes nacionales.
 - ONUSIDA estima que en 2025 se necesitarán 29 000 millones de dólares estadounidenses (en dólares estadounidenses constantes de 2019) para la respuesta al sida en los países de ingresos bajos y medianos, incluidos los países que antes se consideraban países de ingresos altos, para poder poner fin al sida como amenaza para la salud pública mundial.
-

Datos mundiales sobre el VIH

	2000	2005	2010	2021	2022
Personas que viven con el VIH	26,6 millones [22,6 millones - 31,2 millones]	28,9 millones [24,5 millones - 33,8 millones]	31,5 millones [26,7 millones - 36,8 millones]	38,7 millones [32,8 millones - 45,2 millones]	39,0 millones [33,1 millones - 45,7 millones]
Nuevas infecciones por el VIH	2,8 millones [2,2 millones - 3,8 millones]	2,5 millones [1,9 millones - 3,3 millones]	2,1 millones [1,6 millones - 2,8 millones]	1,4 millones [1,1 millones - 1,8 millones]	1,3 millones [1,0 millones - 1,7 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (adultos, a partir de 15 años de edad)	2,3 millones [1,7 millones - 3,1 millones]	2,0 millones [1,5 millones - 2,6 millones]	1,8 millones [1,4 millones - 2,4 millones]	1,3 millones [950 000 - 1,7 millones]	1,2 millones [900 000 - 1,6 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (niños, hasta 14 años)	530 000 [360 000 - 830 000]	480 000 [330 000 - 750 000]	310 000 [210 000 - 490 000]	140 000 [96 000 - 220 000]	130 000 [90 000 - 210 000]
Muertes relacionadas con el sida	1,7 millones [1,3 millones - 2,4 millones]	2,0 millones [1,5 millones - 2,7 millones]	1,3 millones [970 000 - 1,8 millones]	660 000 [500 000 - 920 000]	630 000 [480 000 - 880 000]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2023

Datos regionales de 2022

	Personas que viven con el VIH	Nuevas infecciones por el VIH	Nuevas infecciones por el VIH (adultos, a partir de 15 años de edad)	Nuevas infecciones por el VIH (niños, hasta 14 años)	Muertes relacionadas con el sida
En todo el mundo	39,0 millones [33,1 millones - 45,7 millones]	1,3 millones [1,0 millones - 1,7 millones]	1,2 millones [900 000 - 1,6 millones]	130 000 [90 000 - 210 000]	630 000 [480 000 - 880 000]
Asia y el Pacífico	6,5 millones [5,3 millones - 7,8 millones]	300 000 [220 000 - 400 000]	290 000 [210 000 - 380 000]	12 000 [8600 - 18 000]	150 000 [110 000 - 220 000]
El Caribe	330 000 [290 000 - 380 000]	16 000 [11 000 - 21 000]	14 000 [10 000 - 19 000]	1500 [1100 - 2100]	5600 [4100 - 7500]
África Oriental y Meridional	20,8 millones [17,4 millones - 24,5 millones]	500 000 [370 000 - 670 000]	440 000 [330 000 - 590 000]	58 000 [38 000 - 100 000]	260 000 [200 000 - 370 000]
Europa Oriental y Asia Central	2,0 millones [1,8 millones - 2,1 millones]	160 000 [140 000 - 180 000]	160 000 [130 000 - 180 000]	... [... - ...]	48 000 [38 000 - 58 000]
América Latina	2,2 millones [2,0 millones - 2,5 millones]	110 000 [94 000 - 130 000]	110 000 [90 000 - 130 000]	3800 [2900 - 4700]	27 000 [21 000 - 35 000]
Oriente Medio y África Septentrional	190 000 [160 000 - 220 000]	17 000 [13 000 - 23 000]	16 000 [12 000 - 21 000]	1700 [1300 - 2100]	5300 [4000 - 7100]
África Occidental y Central	4,8 millones [4,2 millones - 5,5 millones]	160 000 [110 000 - 250 000]	110 000 [66 000 - 190 000]	51 000 [34 000 - 69 000]	120 000 [96 000 - 160 000]
Europa Occidental y Central, y América del Norte	2,3 millones [1,9 millones - 2,6 millones]	58 000 [46 000 - 69 000]	57 000 [46 000 - 69 000]	... [... - ...]	13 000 [9300 - 17 000]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2023

Cobertura del tratamiento por regiones en 2022

	Entre las personas que viven con el VIH, porcentaje de adherencia al tratamiento con antirretrovirales (adultos, mayores de 15 años)	Entre las personas que viven con el VIH, porcentaje de adherencia al tratamiento con antirretrovirales (niños, hasta 14 años)	Entre las personas que viven con el VIH, porcentaje de adherencia al tratamiento con antirretrovirales
En todo el mundo	77 % [65 - 90]	57 % [44 - 78]	76 % [65 - 89]
Asia y el Pacífico	65 % [54 - 78]	... [... - ...]	65 % [54 - 78]
El Caribe	69 % [60 - 79]	39 % [31 - 48]	68 % [59 - 78]
África Oriental y Meridional	83 % [70 - 98]	64 % [49 - 93]	83 % [69 - 97]
Europa Oriental y Asia Central	51 % [46 - 56]	... [... - ...]	51 % [46 - 56]
América Latina	72 % [65 - 81]	39 % [33 - 45]	72 % [64 - 80]
Oriente Medio y África Septentrional	51 % [44 - 60]	34 % [29 - 40]	50 % [43 - 59]
África Occidental y Central	82 % [72 - 95]	37 % [29 - 45]	78 % [69 - 90]
Europa Occidental y Central, y América del Norte	76 % [64 - 87]	... [... - ...]	76 % [64 - 87]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2023