

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2023 г.

Глобальная статистика по ВИЧ

- Общемировое число людей, живущих с ВИЧ, в 2022 г. составило 39,0 млн [33,1–45,7 млн] человек.
 - Число новых случаев инфицирования ВИЧ в 2022 г. составило 1,3 млн [1–1,7 млн] человек.
 - Число людей, умерших от связанных со СПИДом болезней в 2022 г., составило 630 000 [480 000–880 000] человек.
 - 29,8 млн человек получали антиретровирусную терапию в 2022 г.
 - 85,6 млн [64,8–113 млн] человек инфицировались ВИЧ с начала эпидемии.
 - 40,4 млн [32,9–51,3 млн] человек умерло от связанных со СПИДом болезней с начала эпидемии.
-

Люди, живущие с ВИЧ

- В 2022 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 39,0 млн [33,1–45,7 млн] человек:
 - 37,5 млн [31,8–43,6 млн] взрослых (15 лет и старше).
 - 1,5 млн [1,2–2,1 миллиона] детей (в возрасте 0–14 лет).
 - Женщины и девочки составляли 53% всех людей, живущих с ВИЧ.
 - В 2022 году 86% [73–98%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.
 - Около 5,5 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ в 2022 г.
-

Люди, живущие с ВИЧ и получающие антиретровирусную терапию

- По состоянию на конец декабря 2022 года 29,8 млн людей получали антиретровирусную терапию по сравнению с 7,7 млн в 2010 году.
- В 2022 г. 76% [65–89%] всех людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению.
 - 77% [65–90%] взрослых в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, и 57% [44–78%] детей в возрасте 0–14 лет имели доступ к лечению.
 - 82% [69–95%] взрослых женщин в возрасте 15 лет и старше имели доступ к лечению, при этом такой доступ был только у 72% [60–84%] взрослых мужчин в возрасте 15 лет и старше.
- 82% [64–98%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению с применением антиретровирусных препаратов с целью предотвращения передачи вируса плоду в 2022 году.

Новые случаи инфицирования ВИЧ

- Число новых случаев инфицирования ВИЧ сократилось на 59% по сравнению с 1995 годом, когда этот показатель достиг пикового значения.
 - В 2022 году число новых случаев ВИЧ-инфекции составило около 1,3 млн [1–1,7 млн] человек, по сравнению с 3,2 млн [2,5–4,3 млн] человек в 1995 году.
 - Женщины и девочки составляли 46% новых случаев ВИЧ-инфекции в 2022 году.
- В 2022 году показатель новых случаев ВИЧ-инфекции снизился на 38% относительно 2010 года, с 2,1 млн [1,6–2,8 млн] до 1,3 млн [1–1,7 млн].
- В 2022 году показатель новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей снизился на 58% относительно 2010 года, с 310 000 [210 000–490 000] до 130 000 [90 000–210 000].

Смертность вследствие СПИДа

- Число людей, умерших вследствие связанных со СПИДом болезней, снизилось на 69% относительно пикового показателя 2004 года и на 51% относительно показателя 2010 года.
- В 2022 году общемировое число умерших от связанных со СПИДом болезней составило 630 000 [480 000–880 000] человек. Для сравнения этот показатель составлял 2,0 млн [1,5–2,8 млн] человек в 2004 году и 1,3 млн [970 000–1,8 млн] человек в 2010 году.
- Уровень смертности, связанной со СПИДом, с 2010 года снизился на 55% среди женщин и девочек и на 47% среди мужчин и мальчиков.

Ключевые группы риска

- Во всем мире среди взрослых людей (в возрасте от 15 до 49 лет) медианная распространенность ВИЧ составляла 0,7%. Однако среди ключевых групп риска медианная распространенность была выше:
 - 2,5% среди секс-работников
 - 7,7% среди мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами
 - 5,0% среди людей, употребляющих инъекционные наркотики
 - 10,3% среди трансгендерных людей
 - 1,4% среди заключенных
-

Женщины и девочки

- В 2022 году 46% всех новых случаев инфицирования ВИЧ во всем мире приходилось на женщин и девочек (всех возрастов).
 - В странах Африки к югу от Сахары на долю женщин и девушек (всех возрастов) приходилось 63% всех новых случаев инфицирования ВИЧ. Во всех других регионах в 2022 году среди мужчин и мальчиков было зарегистрировано более 70% новых случаев инфицирования ВИЧ.
 - Ежедневно в 2022 году 4000 девочек-подростков и молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет по всему миру инфицировались ВИЧ, при этом 3100 таких случаев имели место в странах Африки к югу от Сахары.
-

Цели тестирования и лечения (95-95-95)

- В 2022 году 86% [73–98%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус. Среди людей, знающих свой статус, 89% [75–98%] имели доступ к лечению. И у 93% [79–98%] людей, получающих терапию, была достигнута подавленная вирусная нагрузка.
 - Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет показатели по стратегии 95-95-95 составили 63% [49–86%], 91% [71–98%], 81% [63–98%]. Среди женщин показатели 95-95-95 были следующими: 90% [76–98%], 91% [77–98%] и 93% [79–98%].
 - Показатели 95-95-95 среди мужчин: 83% [70–98%] взрослых мужчин, живущих с ВИЧ, знали о своем статусе, 86% [72–98%] получали лечение и 94% [79–98%] достигли подавленной вирусной нагрузки.
 - В 2022 году из всех людей, живущих с ВИЧ, 86% [73–98%] знали свой статус, 76% [65–89%] имели доступ к лечению и 71% [60–83%] достигли подавленной вирусной нагрузки.
-

Инвестиции

- По состоянию на конец 2022 года было выделено 20,8 млрд долл. США (в постоянных долларах США в ценах 2019 года) на противодействие СПИДу в странах с низким и средним уровнями дохода; около 60% приходилось на внутренние источники.
 - По оценкам ЮНЭЙДС, в 2025 году на противодействие СПИДу потребуется 29 млрд долл. США (в постоянных долларах США в ценах 2019 года) в странах с низким и средним уровнями дохода, включая страны, которые ранее рассматривались как страны с высоким уровнем дохода, для того, чтобы вернуться на путь прекращения эпидемии СПИДа.
-

Глобальные данные по ВИЧ

	2000	2005	2010	2021	2022
Люди, живущие с ВИЧ	26,6 млн [22,6–31,2 млн]	28,9 млн [24,5–33,8 млн]	31,5 млн [26,7–36,8 млн]	38,7 млн [32,8–45,2 млн]	39,0 млн [33,1–45,7 млн]
Новые случаи инфицирования ВИЧ	2,8 млн [2,2–3,8 млн]	2,5 млн [1,9–3,3 млн]	2,1 млн [1,6–2,8 млн]	1,4 млн [1,1–1,8 млн]	1,3 млн [1,0–1,7 млн]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (взрослые в возрасте 15+ лет)	2,3 млн [1,7–3,1 млн]	2,0 млн [1,5–2,6 млн]	1,8 млн [1,4–2,4 млн]	1,3 млн [950 000–1,7 млн]	1,2 млн [900 000–1,6 млн]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (дети в возрасте 0–14 лет)	530 000 [360 000–830 000]	480 000 [330 000–750 000]	310 000 [210 000–490 000]	140 000 [96 000–220 000]	130 000 [90 000–210 000]
Смертность вследствие СПИДа	1,7 млн [1,3–2,4 млн]	2,0 млн [1,5–2,7 млн]	1,3 млн [970 000–1,8 млн]	660 000 [500 000–920 000]	630 000 [480 000–880 000]

Источник: Эпидемиологические оценочные данные ЮНЭЙДС 2023

Региональные данные за 2022 г.

	Люди, живущие с ВИЧ	Новые случаи инфицирования ВИЧ	Новые случаи инфицирования ВИЧ (взрослые в возрасте 15+ лет)	Новые случаи инфицирования ВИЧ (дети в возрасте 0–14 лет)	Смертность вследствие СПИДа
Общемировые показатели	39,0 млн [33,1–45,7 млн]	1,3 млн [1,0–1,7 млн]	1,2 млн [900 000–1,6 млн]	130 000 [90 000–210 000]	630 000 [480 000–880 000]
Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион	6,5 млн [5,3–7,8 млн]	300 000 [220 000–400 000]	290 000 [210 000–380 000]	12 000 [8600–18 000]	150 000 [110 000–220 000]
Карибский регион	330 000 [290 000–380 000]	16 000 [11 000–21 000]	14 000 [10 000–19 000]	1500 [1100–2100]	5600 [4100–7500]
Восточная и Южная Африка	20,8 млн [17,4–24,5 млн]	500 000 [370 000–670 000]	440 000 [330 000–590 000]	58 000 [38 000–100 000]	260 000 [200 000–370 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	2,0 млн [1,8–2,1 млн]	160 000 [140 000–180 000]	160 000 [130 000–180 000]	... [... – ...]	48 000 [38 000–58 000]
Латинская Америка	2,2 млн [2,0–2,5 млн]	110 000 [94 000–130 000]	110 000 [90 000–130 000]	3800 [2900–4700]	27 000 [21 000–35 000]
Ближний Восток и Северная Африка	190 000 [160 000–220 000]	17 000 [13 000–23 000]	16 000 [12 000–21 000]	1700 [1300–2100]	5300 [4000–7100]
Западная и Центральная Африка	4,8 млн [4,2–5,5 млн]	160 000 [110 000–250 000]	110 000 [66 000–190 000]	51 000 [34 000–69 000]	120 000 [96 000–160 000]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	2,3 млн [1,9–2,6 млн]	58 000 [46 000–69 000]	57 000 [46 000–69 000]	... [... – ...]	13 000 [9300–17 000]

Источник: Эпидемиологические оценочные данные ЮНЭЙДС 2023

Региональная антиретровирусная терапия в 2022 году

	% взрослых (старше 15 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	% детей (в возрасте 0–14 лет), живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию	% всех людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию
Общемировые показатели	77% [65–90]	57% [44–78]	76% [65–89]
Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион	65% [54–78]	... [... – ...]	65% [54–78]
Карибский регион	69% [60–79]	39% [31–48]	68% [59–78]
Восточная и Южная Африка	83% [70–98]	64% [49–93]	83% [69–97]
Восточная Европа и Центральная Азия	51% [46–56]	... [... – ...]	51% [46–56]
Латинская Америка	72% [65–81]	39% [33–45]	72% [64–80]
Ближний Восток и Северная Африка	51% [44–60]	34% [29–40]	50% [43–59]
Западная и Центральная Африка	82% [72–95]	37% [29–45]	78% [69–90]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	76% [64–87]	... [... – ...]	76% [64–87]

Источник: Эпидемиологические оценочные данные ЮНЭЙДС 2023