


LA TUBERCULOSE ET LE VIH

EN 2018, 10 MILLIONS DE PERSONNES ONT CONTRACTÉ LA TUBERCULOSE ET 1,5 MILLION EN EST MORT



Les personnes vivant avec le VIH ont jusqu'à **19 fois** plus de risques de contracter **la tuberculose**

LE DÉFICIT DE FINANCEMENT MONDIAL ANNUEL DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE S'ÉLÈVE À **3,3 MILLIARDS DE DOLLARS**

▶ LA TUBERCULOSE EST LA **PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ** CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

L'**ONUSIDA** COOPÈRE AVEC DES PARTENAIRES POUR RÉDUIRE **DE 75% D'ICI 2020** LE NOMBRE DE DÉCÈS LIÉS À LA TUBERCULOSE CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

En 2018, 251 000 personnes séropositives environ sont mortes de la tuberculose

LA TUBERCULOSE PEUT ÊTRE SOIGNÉE : **58 MILLIONS** DE VIES ONT ÉTÉ SAUVÉES DEPUIS 2000

PROGRAMMES VIH/TB SIMPLES, ABORDABLES ET EFFICACES

Chaque personne vivant avec le VIH devrait avoir accès à :

- Thérapie antirétrovirale
- Diagnostic et traitement de la tuberculose
- Dépistage régulier de la tuberculose
- Thérapie préventive de la tuberculose (en cas d'absence de symptômes)



Chaque personne vivant avec la tuberculose devrait avoir accès à :

- Dépistage du VIH et thérapie antirétrovirale
- Traitement de la tuberculose
- Options de prévention du VIH