

CRONOLOGÍA DEL VIH Y DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis (TB) es la principal causa de enfermedad y de muerte entre las personas que viven con el VIH, pero tiene cura.

2030 Fecha fijada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para acabar con el sida y la tuberculosis.



1988 La OMS y la Unión recomiendan un enfoque conjunto para combatir la tuberculosis y el VIH.

2005 Malawi emplea un sistema para entregar la terapia antirretrovírica basado en los modelos de tuberculosis e incorporando los principios de los DOTS. A las personas con tuberculosis se les ofrecen las pruebas del VIH y tienen prioridad de acceso a la terapia antirretrovírica, si dan el perfil. A lo largo del año, el 47 % de las personas registradas con tuberculosis accedió a hacerse las pruebas del VIH; un 69 % dio positivo y el 92 % comenzó el tratamiento contra el VIH.

2003 Aproximadamente un 3% de las personas con tuberculosis se someten a la prueba del VIH.

2004 A escala mundial, la tasa de nuevos casos de tuberculosis alcanza un máximo de 143 (rango de 136 a 151) casos por cada 100 000 habitantes.

2006 La OMS convoca una reunión urgente para hablar sobre las implicaciones de un brote mortífero de tuberculosis extensivamente resistente a los fármacos entre las personas que viven con el VIH en Sudáfrica. La tuberculosis extensivamente resistente a los fármacos es inmune a medicamentos contra la tuberculosis de primer y segundo nivel.

2009 Las nuevas directrices de la OMS recomiendan que todo aquel que tenga tuberculosis y que viva con el VIH debería recibir terapia antirretrovírica, sin importar su recuento de linfocitos CD4.

2010 Un estudio publicado por el *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* sugiere que podría entrenarse a la rata de Gambia para detectar el bacilo tuberculoso. Los investigadores esperan que, con su desarrollado sentido del olfato, este mamífero de 1,5 kg pueda ser parte de los métodos de detección de primer nivel algún día. Las ratas ya están ayudando a detectar minas terrestres.



2010 La OMS respalda una nueva herramienta de pruebas que no necesita técnicos de laboratorio formados. También puede diagnosticar en menos de dos horas casos de tuberculosis y de tuberculosis multirresistente.



2016 Las recomendaciones de la OMS anunciaron que iban a acelerar la detección y a mejorar los resultados de los tratamientos para la tuberculosis multirresistente, mediante el uso de un test de diagnóstico rápido y un régimen de tratamiento más breve y económico.

2016 La Declaración Política sobre el VIH y el Sida incluye trabajar para conseguir el objetivo de reducir las muertes relacionadas con la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH en un 75 % para 2020, así como el compromiso de financiación e implementación para lograr los objetivos 90-90-90 de tuberculosis.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1982 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (la Unión) patrocinan el 24 de marzo el primer Día Mundial de la Tuberculosis, 100 años después de que Robert Koch descubriera el bacilo de la tuberculosis, la causa de esta enfermedad. El descubrimiento del Dr. Koch sentó la base para diagnosticarla y curarla.



1986 Primeros informes sobre la alta prevalencia del VIH entre las personas con tuberculosis en África procedentes de Zaire (República Democrática del Congo). Se confirman casos posteriores en toda el África subsahariana.



1983 Primeros informes que asocian la tuberculosis y el VIH entre las personas que viven con el sida en Haití.



1995 Los datos muestran que las personas que viven con el VIH con tuberculosis activa tienen cargas virales más altas y mueren antes que las personas sin tuberculosis.

1997 Surgen nuevos desafíos en la respuesta a la tuberculosis. En los 35 países estudiados, los investigadores encuentran tasas de tuberculosis multirresistente que superan el 2 % en aproximadamente un tercio de los países estudiados. Las tasas más altas se registraron en los países de la antigua Unión Soviética (incluidos los países bálticos), Argentina, la India y China.



1995-2008 La respuesta general a la tuberculosis muestra un total de 36 millones de personas con tuberculosis tratadas con éxito en los programas DOTS (la estrategia recomendada internacionalmente para el control de la tuberculosis), con hasta 6 millones de muertes evitadas.

1990-2004 El número de casos de tuberculosis se estabiliza o disminuye constantemente en la mayor parte del mundo, excepto en África. En el África subsahariana, la tasa de nuevos casos de tuberculosis aumenta drásticamente impulsada por la epidemia del VIH, especialmente en los lugares donde la prevalencia del VIH entre adultos supera el 5 %.

2002-2007 Los datos de Botswana indican una disminución del número de casos de tuberculosis notificados en todo el país, que coincide con el rápido despliegue de la terapia antirretrovírica. Las mejoras en el programa nacional de tuberculosis de Botswana durante este periodo, incluidas la detección y notificación de casos, implican que esta disminución refleja probablemente una verdadera reducción en las infecciones de tuberculosis gracias a la terapia antirretrovírica.

2006 El expresidente de Portugal, Jorge Sampaio, es nombrado primer enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para detener la tuberculosis.

2015 Eric P. Goosby, nombrado enviado especial de la ONU para la tuberculosis.

2015 La tasa de muertes por tuberculosis es casi la mitad de lo que era en 1990.

2015 El sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible fija una fecha para combatir el HIV, el sida, la malaria y otras enfermedades.



2017 Conferencia Ministerial Mundial de la OMS para poner fin a la tuberculosis, en la que 120 delegaciones nacionales adoptan la Declaración de Moscú sobre Poner Fin a la tuberculosis.

2017 Por primera vez, el número de personas que viven con el VIH que accede al tratamiento excede al número de personas que no están en tratamiento.

2018 26 de septiembre. Por primera vez Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Fin de la Tuberculosis: «Unidos por el fin de la tuberculosis: una respuesta mundial urgente a una epidemia mundial».

2018 La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una Declaración Política en la Lucha Contra la Tuberculosis y se compromete a asegurar que, para 2022, 6 millones de personas que viven con el VIH reciban el tratamiento preventivo para la tuberculosis.

2000-2018 Se estima que se salvaron 58 millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis entre 2000 y 2018.