


# A SIMPLE VISTA



En el África subsahariana cuatro de cada cinco nuevas infecciones por el VIH entre los jóvenes de 10 a 19 años se producen entre las mujeres.

Fuente: Estimaciones de ONUSIDA para 2019.

Las enfermedades relacionadas con el sida constituyen la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 a 49 años de todo el mundo (cientos de miles).



Fuente: Cálculos de salud mundial en 2016: muertes por causa, edad, sexo, país y región, 2000-2016. Ginebra, Organización Mundial de la Salud; 2018.

## 21X

LA INCIDENCIA DEL VIH ES 21 VECES MÁS ELEVADA ENTRE LAS MUJERES TRABAJADORAS DEL SEXO QUE ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL.

Fuente: ONUSIDA, 2019.


Siete de cada diez mujeres en zonas de conflicto y en poblaciones de refugiados están expuestas a la violencia de género y sexual.

Fuente: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures>

Las mujeres que han sido víctimas de violencia tienen un **50 %** más de posibilidades de vivir con el VIH.

Las mujeres que han sufrido abusos físicos o sexuales por parte de sus parejas presentan una mayor prevalencia de problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, mayor consumo de alcohol y menos control sobre las decisiones que toman respecto al sexo.

Fuente: Jewkes, R. et al (2010). Intimate partner violence, relationship power inequity, and incidence of HIV infection in young women in South Africa: a cohort study (La violencia dentro de la pareja, la desigualdad de poder en la relación y la incidencia de la infección del VIH en mujeres jóvenes en Sudáfrica: estudio de cohorte). The Lancet 376(9734):41-48.



Un **16 %** de las adolescentes y mujeres jóvenes del mundo rural actualmente casadas que viven en el África subsahariana utilizan un anticonceptivo moderno.

Fuente: Encuestas a la población, 2011-2016. Dichas estadísticas se basan en los datos disponibles procedentes de los 28 países en los que vive el 83 % de las mujeres entre los 15 y los 24 años del África subsahariana.



Un **23 %** de las adolescentes y mujeres jóvenes del mundo urbano actualmente casadas que viven en el África subsahariana utilizan un anticonceptivo moderno.



De cada cinco nuevas infecciones por el VIH entre jóvenes (de 15 a 24 años), tres se producen entre mujeres.

Fuente: Estimaciones de ONUSIDA para 2019.

## UN 52 %

de las chicas adolescentes y las mujeres jóvenes de las áreas rurales son incapaces de tomar decisiones respecto de su salud, en comparación con el

## 47 %

de las áreas urbanas.

EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA, EL 42 % DE LAS MUJERES DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS QUE RESIDEN EN LAS ÁREAS URBANAS SE QUEDARON EMBARAZADAS ANTES DE LOS 18 AÑOS.

EN LAS ÁREAS RURALES, MÁS DEL 50 % DE LAS MUJERES DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS SE QUEDARON EMBARAZADAS ANTES DE LOS 18 AÑOS.

Fuente: Encuestas a la población, 2011-2016. Dichas estadísticas se basan en los datos disponibles procedentes de los 27 países en los que vive el 80% de las mujeres entre los 15 y los 24 años del África subsahariana.

Cada año 12 millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18 años. Estos matrimonios prematuros ponen en peligro su desarrollo personal y su bienestar.

Fuente: Cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018.

## ALREDEDOR DE

# 44

chicas adolescentes (10-19 años) murieron diariamente en 2018 por enfermedades relacionadas con el sida.

Fuente: Estimaciones de ONUSIDA para 2019.